Инструкция по применению
Трекресил таблетки 200 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Аромасинтез
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 200 мг

Действующее вещество

Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат

Состав

На 1 таблетку: Действующее вещество: Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат - 200 мг Вспомогательные вещества: Лактозы моногидрат - 200 мг Крахмал картофельный - 95 мг Кальция стеарат - 5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Согласно имеющимся данным оксиэтиламмония метилфеноксиацетат обладает высокой биодоступностью, быстро метаболизируется в печени, выделяясь почками преимущественно в виде глюкуронидов. Не кумулирует в организме при длительном применении. Фармакокинетика в особых клинических случаях У лиц пожилого возраста, детей 12-18 лет, пациентов с почечной и печеночной недостаточностью фармакокинетика оксиэтиламмония метилфеноксиацетата существенно не меняется.

Показания

В составе комплексной терапии: при профилактике и лечении острых респираторных вирусных инфекций, в период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок, для повышения устойчивости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптации к перепадам атмосферного давления).

Способ применения и дозы

Внутрь. Для профилактики острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: Взрослым и детям старше 12 лет назначают - по 1 таблетке (200 мг) в сутки после еды. Всего на курс 14 таблеток (суммарная доза 2800 мг), длительность курса 14 дней, Для лечения острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: Взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день по 1 таблетке 3 раза (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней. В период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок в составе комплексной терапии: Взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней. Для повышения устойчивости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптации к перепадам атмосферного давления), в составе комплексной терапии Взрослым и детям старше 12 лет назначают - в первый день 3 таблетки (600 мг) в сутки, в последующие 7 дней по 1 таблетке (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса 8 дней. Если по истечении 3-х дневного срока лечения отсутствует улучшение самочувствия и симптомы вышеуказанных состояний не уменьшаются или становятся более выраженными, пациенту следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Детский возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности применения). Наследственная непереносимость лактозы, недостаточность лактазы или нарушение всасывания глюкозы и галактозы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности применения).

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, анафилактический шок, анафилаксия, отек Квинке. Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препаратом не отмечены. В случае передозировки рекомендуется симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано.

Особые указания

Пациентам с сахарным диабетом необходимо соблюдать осторожность при применении препарата Трекресил. В случае острой респираторной вирусной инфекции, если у Вас наблюдаются перечисленные ниже признаки, то они, как правило, свидетельствуют о более тяжелом состоянии и требуют обязательного обращения к специалисту - семейному врачу или терапевту: повышение температуры тела выше 39 °С (высокая лихорадка), повышение температуры сопровождается сильной болью, одышкой, нарушением сознания, судорогами, при симптомах острого респираторного заболевания температура тела выше 38,5 °С отмечается в течение 3 дней и более, температура выше 37,5 °С держится 2 недели и более. Учитывая, что фармакокинетические параметры оксиэтиламмония метилфеноксиацетата существенно не меняются, отсутствует необходимость соблюдать какие-либо особенности и ограничения применения препарата у детей 12-18 лет, пожилых пациентов, пациентов с нарушением функций печени, почек, кроме указанных в инструкции. Не рекомендуется превышать рекомендованную дозировку. Влияние на способность управлять трансп. Ср. И мех. : Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищённом от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.