# Инструкция по применению
# Трекрезан Таблетки 200 мг 20 шт

## Характеристики




Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Гротекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 24.0




## Описание

Трекрезан - тройное действие против ОРВИ.  1. Активен при первых симптомах простуды  2. Эффективен на пике заболевания  3. Помогает быстрее восстановить силы после болезни

## Действующее вещество

Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат

## Состав

_1 таблетка содержит:_ _Действующее вещество:_ Оксиэтиламмония метилфеноксиацетат (трекрезан) 200 мг _Вспомогательные вещества:_ Лактозы моногидрат (сахар молочный) 200 мг Микрокристаллическая целлюлоза 92,5 мг Натрия стеарилфумарат 5 Кремния диоксид коллоидный (аэросил) 2,5 мг

## Форма выпуска

Таблетки

**Фармакокинетика**

Согласно имеющимся данным оксиэтиламмония метилфеноксиацетат обладает высокой биодоступностью, быстро метаболизируется в печени, выделяясь почками преимущественно в виде глюкуронидов. Не кумулирует в организме при длительном применении. У лиц пожилого возраста, детей в возрасте 12-18 лет, пациентов с почечной и печеночной недостаточностью фармакокинетика оксиэтиламмония метилфеноксиацетата существенно не меняется.

**Показания**

В составе комплексной терапии: - при профилактике и лечении острых респираторных вирусных инфекций; - в период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок; - для повышения устойчивости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптации к перепадам атмосферного давления)..

**Способ применения и дозы**

Препарат принимают внутрь. Для профилактики острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таб. (200 мг)/сут, после еды. Всего на курс 14 таблеток (суммарная доза 2800 мг), длительность курса - 14 дней. Для лечения острых респираторных вирусных инфекций в составе комплексной терапии: взрослым и детям старше 12 лет назначают в первый день по 1 таб. 3 раза (600 мг)/сут, в последующие 7 дней по 1 таб. (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса - 8 дней. В период высоких интеллектуальных и тяжелых физических нагрузок в составе комплексной терапии взрослым и детям старше 12 лет назначают в первый день 3 таб. (600 мг)/сут, в последующие 7 дней по 1 таб. (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса - 8 дней. Для повышения устойчивости организма различным стрессовым воздействиям (гипоксия, перегревание, переохлаждение) и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (резкая смена климатических условий, адаптации к перепадам атмосферного давления), в составе комплексной терапии взрослым и детям старше 12 лет назначают в первый день 3 таб. (600 мг)/сут, в последующие 7 дней по 1 таб. (200 мг). Всего на курс 10 таблеток (суммарная доза 2000 мг), длительность курса - 8 дней. Если по истечении 3-дневного срока лечения отсутствует улучшение самочувствия и симптомы вышеуказанных состояний не уменьшаются или становятся более выраженными, пациенту следует обратиться к врачу.

**Противопоказания**

\- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата; \- детский возраст до 12 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности применения); \- наследственная непереносимость лактозы, недостаточность лактазы или нарушение всасывания глюкозы и галактозы.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности применения).

**Побочные действия**

Редко: возможны аллергические реакции - реакции гиперчувствительности, анафилактический шок, анафилаксия, отек Квинке. Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются или отмечаются любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, пациенту необходимо сообщить об этом врачу.

**Передозировка**

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены. Лечение: в случае передозировки рекомендуется проведение симптоматической терапии.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Нежелательного взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описано.

**Особые указания**

Пациентам с сахарным диабетом необходимо соблюдать осторожность при применении препарата Трекрезан. - В случае острой респираторной вирусной инфекции, если у пациента наблюдаются перечисленные ниже признаки, это, как правило, свидетельствуют о более тяжелом состоянии и требует обязательного обращения к специалисту - семейному врачу или терапевту: - повышение температуры тела выше 39°С (высокая лихорадка); - повышение температуры сопровождается сильной болью, одышкой, нарушением сознания, судорогами; - при симптомах острого респираторного заболевания температура тела выше 38.5°С отмечается в течение 3 дней и более; - температура выше 37.5°С держится 2 недели и более. Учитывая, что фармакокинетические параметры оксиэтиламмония метилфеноксиацетата существенно не меняются, отсутствует необходимость соблюдать какие-либо особенности и ограничения применения препарата у детей 12-18 лет, пожилых пациентов, пациентов с нарушением функций печени, почек, кроме указанных в инструкции. Не рекомендуется превышать рекомендуемую дозу. Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами Применение препарата не оказывает влияния на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В сухом месте