Инструкция по применению
Триакорт Мазь для наружного применения 0,1 % 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Триамцинолон
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь от белого до желтовато-белого цвета.

Действующее вещество

Триамцинолон

Состав

100 г мази содержат: активное вещество: триамцинолона ацетонид в пересчете на 100% вещество -0,1 г, вспомогательные вещества: глицерол (глицерин) 5 г, пропиленгликоль 8 г, диметилсульфоксид 3 г, вазелин 21 г, стеариновая кислота 3 г, воск эмульсионный 8 г, вода очищенная до 100 г.

Форма выпуска

Мазь

Показания

Простые и аллергические дерматиты, экзема, атопический дерматит, диффузный нейродермит, псориаз, гранулема кольцевидная, красный плоский лишай, простой хронический лишай (ограниченный нейродермит), токсидермия, келоидные рубцы, гнездная алопеция, полная алопеция, укусы насекомых.

Способ применения и дозы

Мазь наносят равномерно тонким слоем на пораженные участки кожи 1-3 раза в день. Можно применять с окклюзионной повязкой при лихенифицированных проявлениях. Продолжительность лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, составляя обычно 5-10 дней. При упорном течении болезни курс лечения может быть продлен до 25 дней. Не рекомендуется применение более 4 недель.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к триамцинолону и другим компонентам препарата, бактериальные, вирусные и грибковые заболевания кожи, беременность, период лактации.

Побочные действия

Зуд, раздражение кожи, контактная экзема, стероидные угри, пурпура. При длительном применении - развитие вторичных инфекционных поражений и трофических изменений кожи.

Взаимодействие с другими препаратами

Глюкокортикостероидные препараты для перорального применения усиливают эффект.

Особые указания

Не рекомендуется наносить на большие поверхности, избегать длительного применения у детей независимо от возраста. Для профилактики местных инфекционных осложнений возможно применение в сочетании с противомикробными лекарственными средствами.

Условия хранения

При температуре не выше 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.