
Инструкция по применению
Триазавирин Капсулы 100 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МЕДСИНТЕЗ ЗАВОД
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Риамиловир
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Описание

Твердые желатиновые капсулы размера № 1, корпус желтого и крышечка красного цвета. Содержимое капсул - мелкокристаллический порошок или гранулы желтого или желто-зеленого цвета.

Действующее вещество

Риамиловир

Состав

Каждая капсула содержит 100 мг риамиловира (соответствует риамиловиру дигидрату).Вспомогательными веществами являются кальция стеарат, капсула (корпус) № 1 (титана диоксид (Е171), краситель хинолиновый желтый (Е104), краситель красный очаровательный (Е129), желатин медицинский), капсула (крышечка) № 1 (титана диоксид (Е171), краситель красный очаровательный (Е129), желатин медицинский).

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат ТРИАЗАВИРИН применяется у детей в возрасте от 6 до 17 лет в составе комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.Рекомендуемая дозаДети от 12 до 17 лет: по 1 капсуле (100 мг) 3 раза в день (с интервалом 4-5 ч) и 2 капсулы (200 мг) на ночь в течение 5 последовательных дней. Максимальная разовая доза: 2 капсулы (200 мг). Максимальная суточная доза: 5 капсул (500 мг).Дети от 6 до 11 лет: по 1 капсуле (100 мг) 2 раза в день, утром и вечером, в течение 5 последовательных дней. Максимальная разовая доза: 1 капсула (100 мг). Максимальная суточная доза: 2 капсулы (200 мг).Путь и способ введенияПринимать препарат внутрь независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством питьевой воды. Проглатывать капсулу целиком, не разжевывать и не раздавливать капсулу.Продолжительность терапииПрием препарата необходимо начинать не позднее 2-го дня от начала заболевания (проявления симптомов острых респираторных вирусных инфекций).Если в течение 5 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания

Не принимайте препарат ТРИАЗАВИРИН®: если у Вас аллергия на риамиловир или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша), если Вы беременны, если Вы кормите грудью, если у Вас почечная или печеночная недостаточность (эффективность и безопасность не определены).

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Беременность Не принимайте препарат ТРИАЗАВИРИН®, если Вы беременны, ввиду отсутствия исследований. Грудное вскармливание Не принимайте препарат ТРИАЗАВИРИН®, если Вы кормите грудью, так как применение препарата во время грудного вскармливания не изучалось. При необходимости применения препарата в период лактации прекратите грудное вскармливание.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат ТРИАЗАВИРИН® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.Прекратите прием препарата ТРИАЗАВИРИН® и немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): выраженные отеки на губах, веках, щеках, слизистой оболочке рта, могут распространяться на слизистую оболочку гортани, что может вызвать затруднение дыхания, отмечается охриплость голоса, лающий кашель (ангионевротический отек) (реакции наблюдались только у взрослых пациентов при применении препарата ТРИАЗАВИРИН®, 250 мг, капсулы).Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата ТРИАЗАВИРИН®:Реакции наблюдались у детей в возрасте от 12 до 17 лет во время клинических исследований препарата ТРИАЗАВИРИН®, 100 мг, капсулы:часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10): понижение частоты сердечных сокращений,нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): повышение количества эозинофилов в крови. Реакции наблюдались у детей в возрасте от 6 до 11 лет во время клинических исследований препарата ТРИАЗАВИРИН®, 100 мг, капсулы:нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): понижение систолического артериального давления, повышение доли нейтрофилов сегментоядерных в лейкоцитарной формуле крови.Реакции наблюдались у взрослых пациентов во время клинических исследований препарата ТРИАЗАВИРИН®, 100 мг, капсулынечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100): повышение количества эозинофилов в крови, пастообразный стул и вздутие, боль в животе, сыпь, повышение в моче эритроцитов, лейкоцитов, плоского эпителия, наличие бактерий в моче.Реакции наблюдались у взрослых пациентов во время клинических исследований и во время пострегистрационного применения препарата ТРИАЗАВИРИН®, 250 мг, капсулы: частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно): повышение количества моноцитов в крови, сыпь, зуд, зуд, покраснение кожи с появлением пузырей и волдырей (крапивница), дискомфорт в области живота, может сопровождаться рвотой, пастообразным стулом, метеоризмом, болью в животе, сухостью во рту, чувством горечи во рту, изжогой, тошнотой, отрыжкой, вздутием, диареей (диспепсические явления), головная боль, головокружение, повышение в моче эритроцитов, лейкоцитов, плоского эпителия, наличие бактерий в моче, повышение уровня «печеночных» ферментов в крови (аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ)), повышение уровня глюкозы в крови, повышение креатинина в крови, слабость.

Передозировка

Если Вы приняли препарата ТРИАЗАВИРИН® больше, чем следовало Если Вы приняли слишком много препарата ТРИАЗАВИРИН®, у Вас могут начаться тошнота, рвота, диспепсические расстройства, боли в желудке. В этом случае прекратите прием препарата и обратитесь к врачу. Если Вы забыли принять препарат ТРИАЗАВИРИН® Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную капсулу. Если Вы прекратили прием препарата ТРИАЗАВИРИН® Не прекращайте прием препарата до окончания курса лечения (5 последовательных дней) или профилактического приема (10 дней) без консультации врача в связи с возможным отсутствием ожидаемого эффекта. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Специальные исследования взаимодействия препарата ТРИАЗАВИРИН® с другими препаратами не проводились.

Особые указания

Если приняли препарата больше, чем следовалоЕсли принято слишком много препарата ТРИАЗАВИРИН, могут начаться тошнота, рвота, диспепсические расстройства, боли в желудке. В этом случае необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.Если забыли принять препаратЕсли забыли принять препарат в нужное время, следует принять следующую капсулу и далее следовать обычному графику дозирования с обычными промежутками времени между приемами. Нельзя принимать двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенный прием.Если прекратили прием препаратаНельзя прекращать прием препарата до окончания курса лечения (5 последовательных дней). Если прекратить прием препарата слишком рано, инфекционное заболевание может быть полностью не вылечено и его симптомы могут возвратиться или ухудшиться.При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Допускается хранить и перевозить препарат в защищенном от света месте при температуре от минус 50 до 50 °С в течение не более чем 30 дней.