Инструкция по применению
Тридукард Таблетки с модифицированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой 35 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Северная Звезда
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Триметазидин
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 35 мг



Описание

Таблетки с модифицированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой розового цвета, круглые, двояковыпуклые

Действующее вещество

Триметазидин

Состав

Одна таблетка с модифицированным высвобождением, покрытая пленочной оболочкой, содержит активного вещества триметазидина дигидрохлорида 35 мг. Вспомогательные вещества: гипромеллоза (метоцель К 4М Premium EP) – 54 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 118 мг, кремния диоксид коллоидный (аэросил) – 1 мг, магния стеарат – 1 мг, Состав оболочки: Гидроксипропилметилцеллюлоза (гипромеллоза) – 4,628 мг, тальк – 0,357 мг, титана диоксид -1,002 мг, макрогол (полиэтиленоксид 4000) – 1,002 мг, краситель азорубин (кислотный красный 2С для фармацевтических целей) - 0,011 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема препарата внутрь триметазидин быстро и практически полностью абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность - 90%. Время достижения максимальной концентрации в плазме крови - 2 часа. Максимальная концентрация после однократного приема 35 мг триметазидина - около 55 нг/мл. Легко проходит через гистогематические барьеры. Период полувыведения (T1/2) составляет 4,5-5 часов. Связь с белками плазмы - 16%. Выводится из организма почками (около 60% - в неизмененном виде).

Показания

Ишемическая болезнь сердца:профилактика приступов стенокардии (в комплексной терапии), - Хориоретинальные сосудистые нарушения, Головокружение сосудистого происхождения, Кохлео-вестибулярные нарушения ишемической природы (шум в ушах, нарушение слуха)

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Рекомендуемый режим дозирования 2 таблетки (70 мг) в сутки, в 2 приема. Курс лечения по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, Почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 15 мл/мин), Выраженные нарушения функции печени, Беременность, Период грудного вскармливания, Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Побочные действия

Аллергические реакции (кожный зуд). Редко со стороны желудочно-кишечного тракта: гастралгия, тошнота, рвота, головная боль, ощущение сильного сердцебиения.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Особые указания

Препарат не предназначен для купирования приступов стенокардии! В случае развития приступа стенокардии следует пересмотреть и адаптировать лечение (лекарственную терапию или проведение реваскуляризации). Применение препарата не влияет на способность к управлению автомобилем и выполнения работ, требующих высокой скорости психических и физических реакций.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 С. Хранить в недоступном для детей месте.