Инструкция по применению
Триган раствор для инъекций ампулы 2 мл 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Индия
Производитель: Cadila Pharmaceuticals
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дицикловерин
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 10 мг/мл



Описание

Спазмолитическое средство

Действующее вещество

Дицикловерин

Состав

дицикловерина гидрохлорид

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

После в/м введения время достижения Cmax составляет 60-90 мин, T1/2 - 1.8 ч. Выводится почками - 79.5%.

Показания

Колика (кишечная, печеночная, почечная), альгодисменорея.

Способ применения и дозы

Вводят в/м, разовая доза - 20 мг. При необходимости повторного введения интервал между инъекциями должен составлять 4-6 ч.

Противопоказания

Обструктивные заболевания кишечника, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, рефлюкс-эзофагит, гиповолемический шок, закрытоугольная глаукома, миастения, детский возраст до 6 месяцев, период лактации, повышенная чувствительность к дицикловерину.

Применение при беременности и кормлении грудью

Дицикловерин противопоказан к применению в период лактации.

Побочные действия

Со стороны ЦНС: головокружение, сонливость.Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота, запор, потеря вкусовых ощущений, анорексия.Со стороны органа зрения: паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления.Прочие: аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с амантадином, антипсихотическими препаратами, бензодиазепинами, ингибиторами МАО, опиоидными анальгетиками, нитратами и нитритами, симпатомиметиками, трициклическими антидепрессантами, м-холиноблокаторами, ГКС действие дицикловерина усиливается. Дицикловерин усиливает действие сердечных гликозидов.

Особые указания

При высокой температуре окружающей среды повышается вероятность гипертермии и развития теплового удара вследствие снижения потоотделения.

Условия хранения

Беречь от детей, при комнатной температуре