Инструкция по применению
Триган-Д Таблетки 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: КАДИЛА
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Дицикловерин+Парацетамол
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг+ 20 мг
Срок годности: 36



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и риской на одной стороне.

Действующее вещество

Дицикловерин+Парацетамол

Состав

Одна таблетка содержит: _Действующие вещества:_ Парацетамол \- 500 мг Дицикловерина гидрохлорид \- 20 мг _Вспомогательные вещества:_ Карбоксиметилкрахмал натрия \- 25,0 мг Крахмал кукурузный \- 15,0 мг Целлюлоза микрокристаллическая \- 17,5 мг Повидон К-30 \- 4,5 мг Кремния диоксид коллоидный (аэросил) \- 3,0 мг Магния стеарат \- 5,0 мг

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 60-90 мин. Объем распределения составляет 3,65 л/кг. Парацетамол метаболизируется в печени с образованием нескольких метаболитов, один из которых - N-ацетил-бензохинонимин - при определенных условиях (передозировка препарата, недостаток глутатиона в печени) может оказать повреждающее действие на печень и почки. Около 80% препарата выводится с мочой и в небольшомколичестве - с калом.

Показания

Спазм гладкой мускулатуры внутренних органов - кишечная, печеночная и почечная колика, альгодисменорея; Головная, зубная, мигренозная боль, невралгия, миалгия; Инфекционно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся лихорадкой.

Способ применения и дозы

Применяется внутрь взрослым и детям старше 15 лет по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Максимальная разовая доза для взрослых составляет 2 таблетки, суточная - 4 таблетки. Продолжительность приема без консультации с врачом - не более 5 дней при назначении в качестве обезболивающего средства и 3-х дней - в качестве жаропонижающего средства. При продолжительном применении препарата необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени. **Не превышайте суточную дозу,** т.к. передозировка препарата может вызвать печеночную недостаточность.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к парацетамолу или дицикловерину, или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата, обструктивные заболевания кишечника, желчных и мочевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (фаза обострения), рефлюкс-эзофагит, гиповолемический шок, миастения gravis, беременность, период лактации. Детский возраст (до 15 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Препарат Триган-Д противопоказан при беременности. Лактация Препарат Триган-Д противопоказан в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны пищеварительного тракта: затруднения при глотании и разговоре, жажда, рвота, снижение подвижности и тонуса желудочно-кишечного тракта, сухость во рту, запор. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, кратковременная брадикардия. Со стороны нервной системы: головокружение, пошатывание, сонливость. Со стороны глаз: повышение внутриглазного давления, фотофобия, расширение зрачков с утратой аккомодации. Другие: недержание мочи, сухость и покраснение кожи, аллергические реакции, угнетение кроветворения.

Особые указания

Со стороны пищеварительного тракта: затруднения при глотании и разговоре, жажда, рвота, снижение подвижности и тонуса желудочно-кишечного тракта, сухость во рту, запор. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, аритмия, кратковременная брадикардия. Со стороны нервной системы: головокружение, пошатывание, сонливость. Со стороны глаз: повышение внутриглазного давления, фотофобия, расширение зрачков с утратой аккомодации. Другие: недержание мочи, сухость и покраснение кожи, аллергические реакции, угнетение кроветворения.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!