Инструкция по применению
Триовит капсулы 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Словения
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30

Описание

Твердые желатиновые капсулы №1 вишнево-красного цвета. Содержимое капсул – смесь порошков красновато-коричневого, коричневого и желтовато-белого цвета.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

Одна капсула содержит: Активные вещества: Бетатаб 20 % - 50,0 мг* Дрожжи селенсодержащие 2000 - 25,0 мг** Аскорбиновая кислота - 100,0 мг*** Альфа-токоферола ацетат 50% - 80,0 мг**** Вспомогательные вещества: тальк, кремния диоксид коллоидный, безводный, магния стеарат. *50,0 мг бетатаба 20 % соответствует 10,0 мг бетакаротена (состав: бетакаротен, dl-альфа-токоферол, аскорбилпальмитат, натрия аскорбат, сахароза, желатин, крахмал кукурузный), ** 25,0 мг дрожжей селенсодержащих 2000 соответствует 50,0 мкг селена в сочетании с дрожжами, *** аскорбиновая кислота, покрытая оболочкой, тип ЕС (состав: аскорбиновая кислота, этилцеллюлоза), **** 80,0 мг альфа-токоферола ацетата 50 % соответствует 40,0 мг альфа-токоферола ацетата (состав: альфа-токоферола ацетат, кремния диоксид, крахмал кукурузный). Состав капсулы: Крышечка: желатин, титана диоксид (Е171), краситель хинолиновый желтый (Е104), краситель азорубин (Е122), Корпус: желатин, титана диоксид (Е171), краситель хинолиновый желтый (Е104), краситель азорубин (Е122).

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные для капсул ТРИОВИТ® отсутствуют.

Показания

* Дефицит витамина С, витамина Е, бетакаротена и селена в пище, * повышенная потребность в витаминах и селене при: * проживании в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, в частности, больших городах и крупных промышленных центрах, * повышенных физических и умственных нагрузках, * никотиновой зависимости, * повышенном воздействии активного солнечного облучения.

Способ применения и дозы

Внутрь, предпочтительно после еды, запивая небольшим количеством воды. Взрослым и детям старше 15 лет – по 1-2 капсуле 1 раз в день. Курс приёма капсул ТРИОВИТ® – 2 месяца. Повторные курсы приема капсул ТРИОВИТ® – по рекомендации врача. Дети с 10 до 15 лет – по 1 капсуле 1 раз в день (по рекомендации врача).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст до 10 лет, гипервитаминоз А и Е, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препара Триовит® при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Пожелтение кожных покровов, изменение цвета мочи, чувство тяжести в желудке, метеоризм, аллергические реакции (в т.ч. бронхиальная астма, бронхоспазм), крапивница.

Передозировка

Большие дозы (более 15 капсул в сутки) могут вызывать тошноту и изменение цвета кожи и ногтей. Прием препарата в этом случае необходимо прекратить. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных о лекарственном взаимодействии препарата с другими лекарственными средствами.

Особые указания

В редких случаях возможны аллергические реакции, (в т.ч. бронхиальная астма) на отдельные компоненты препарата, требующие отмены препарата и обращения к врачу. При приёме капсул натощак может возникнуть чувство тяжести в желудке или метеоризм. Перед одновременным применением других витаминных, витаминно-минеральных или минеральных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. При длительном приеме бетакаротена возможно желтое окрашивание кожных покровов, что неопасно. При прекращении приёма капсул ТРИОВИТ® жёлтое окрашивание кожи исчезает.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.