
Инструкция по применению
Триплатенз Таблетки 5 мг + 2,5 мг + 8 мг 30 шт



Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Симпекс Фарма
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Амлодипин+Индапамид+Периндоприл
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 5 мг + 2,5 мг + 8 мг

Описание

ТРИПЛАТЕНЗ® 5 мг + 2,5 мг + 8 мг, таблетки Препарат представляет собой круглые двояковыпуклые таблетки белого или почти белого цвета.

Действующее вещество

Амлодипин+Индапамид+Периндоприл

Состав

Действующими веществами являются: амлодипин, индапамид и периндоприл ТРИПЛАТЕНЗ® 5 мг + 2,5 мг + 8 мг, таблетки Каждая таблетка содержит амлодипина безилат 6,935 мг, что соответствует амлодипину 5,0 мг, индапамид 2,5 мг и периндоприла эрбумин 8,0 мг. Прочими ингредиентами являются целлюлоза микрокристаллическая (PH 101), крахмал прежелатинизированный, натрия гидрокарбонат, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), кальция хлорида гексагидрат, целлюлоза микрокристаллическая (PH 112), кремния диоксид коллоидный, магния стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Препарат ТРИПЛАТЕН3® применяется для лечения взрослых пациентов старше 18 лет. В качестве терапии у пациентов с артериальной гипертензией при снижении артериального давления (АД) на фоне приема амлодипина, индапамида и периндоприла в тех же дозах.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза Одна таблетка в сутки. Ваш лечащий врач подберет подходящую для Вас дозу. Способ применения Внутрь, одно и тоже время суток, предпочтительно утром. Таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая водой. Продолжительность лечения Препараты для лечения повышенного артериального давления должны приниматься постоянно, каждый день, пока лечащий врач не отменит назначение препарата. Если Вы забыли принять препарат ТРИПЛАТЕН3® Важно принимать препарат каждый день, так как регулярность приема делает лечение более эффективным. Тем не менее, если Вы забыли принять очередную дозу препарата ТРИПЛАТЕН3®, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата ТРИПЛАТЕН3®, чтобы компенсировать пропущенную дозу. Если Вы прекратили принимать препарат ТРИПЛАТЕН3® Поскольку лечение повышенного артериального давления обычно проводится постоянно, не прекращайте прием препарата ТРИПЛАТЕН3® без предварительного обсуждения с Вашим лечащим врачом. Если у Вас есть вопросы о применении препарата ТРИПЛАТЕН3®, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

Не принимайте препарат ТРИПЛАТЕН3®, если: Если хотя бы что-либо из перечисленных состояний применимо к Вам, посоветуйтесь со своим врачом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Вы не должны принимать препарат ТРИПЛАТЕНЗ® во время беременности и кормления грудью. Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Беременность Не принимайте препарат во время беременности. Вы должны проинформировать своего лечащего врача, если думаете, что беременны (или можете забеременеть). Как правило, врач посоветует Вам прекратить прием препарата ТРИПЛАТЕНЗ® до наступления беременности или сразу же, как только Вы узнаете, что беременны. Врач посоветует Вам принимать другой препарат вместо препарата ТРИПЛАТЕНЗ®. Препарат ТРИПЛАТЕНЗ® противопоказан во время беременности, так как его прием может нанести серьезный вред здоровью ребенка. Грудное вскармливание Не кормите ребенка грудью во время приема препарата. Сообщите своему лечащему врачу о том, что Вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Препарат ТРИПЛАТЕНЗ® не рекомендован при грудном вскармливании, и Ваш врач может выбрать другое лечение для Вас, если Вы хотите кормить грудью, особенно если Ваш ребенок новорожденный или родился преждевременно. Нет данных

Побочные действия

Препарат ТРИПЛАТЕНЗ® может вызывать нежелательные реакции, но они возникают не у всех. Серьёзные нежелательные реакции (сообщайте врачу немедленно): Другие нежелательные реакции: Важно: при любых нежелательных реакциях проконсультируйтесь с врачом. Сообщайте о реакциях — это помогает улучшать безопасность препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарата ТРИПЛАТЕНЗ® больше, чем следовало Если Вы приняли слишком много таблеток, немедленно сообщите об этом Вашему лечащему врачу или свяжитесь с ближайшим пунктом скорой помощи. Передозировка может привести к снижению артериального давления или даже к опасному снижению артериального давления, что иногда сопровождается тошнотой, рвотой, судорогами, головокружением, сонливостью, спутанностью сознания, олигурией (уменьшение количества выделяемой мочи), анурией (отсутствие образования или выделения мочи). Вы можете чувствовать головокружение, слабость или предобморочное состояние. При значительном снижении артериального давления может развиться шок, кожа становится холодной и липкой, и Вы можете потерять сознание.

Взаимодействие с другими препаратами

Перед приёмом препарата ТРИПЛАТЕНЗ® сообщите врачу или фармацевту о всех принимаемых, недавно принятых или планируемых к приёму лекарствах. Запрещён одновременный приём ТРИПЛАТЕНЗ® со следующими препаратами: Требуется особая осторожность при приёме ТРИПЛАТЕНЗ® с: Приём с пищей и напитками: Не употребляйте грейпфрут и грейпфрутовый сок во время лечения ТРИПЛАТЕНЗ® — они могут повысить уровень амлодипина в крови и усилить эффект препарата, что приведёт к чрезмерному снижению АД.

Особые указания

Не принимайте препарат ТРИПЛАТЕНЗ®, если: Если хотя бы что-либо из перечисленных состояний применимо к Вам, посоветуйтесь со своим врачом. Ваш врач может проводить регулярный контроль функции почек, артериального давления и содержания электролитов (например, калия, натрия, кальция) в крови. Смотрите также информацию, приведенную в разделе «Противопоказания». Вы должны сообщить Вашему врачу, если Вы думаете, что беременны (или можете забеременеть). Препарат ТРИПЛАТЕНЗ® не должен приниматься во время беременности, так как это может причинить серьезный вред ребенку (смотрите раздел «Беременность и грудное вскармливание»). Если Вы принимаете ТРИПЛАТЕНЗ®, Вы также должны сообщить своему врачу или медицинскому персоналу: Спортсмены должны знать, что ТРИПЛАТЕНЗ® содержит действующее вещество (индапамид), который может давать положительную реакцию при допинг-контроле. Дети и подростки Препарат ТРИПЛАТЕНЗ® не предназначен для применения у детей и подростков до 18 лет. Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения. Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу. Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими. Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции. Прием препарата ТРИПЛАТЕНЗ® может повлиять на Вашу способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Если во время приема данного лекарственного препарата Вы чувствуете тошноту, головокружение, слабость, утомляемость или головную боль, воздержитесь от управления транспортными средствами или механизмами и немедленно обратитесь к своему лечащему врачу.

Условия хранения

Храните при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (блистер в пачке). Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.