Инструкция по применению
Троксерутин Гель для наружного применения 2% 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Промомед
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачный однородный гель от желтого до зеленовато-желтого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха.

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

На 100 г геля: Действующее вещество: Троксерутин - 2,00 г, Вспомогательные вещества: карбомер (Карбопол Ультрез 10 NF Полимер) - 0,50 г, динатрия эдетат - 0,05 г, бензалкония хлорид - 0,10 г, натрия гидроксид - 0,53 г, вода очищенная - до 100,00 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При нанесении геля на кожу активный компонент геля быстро проникает через эпидермис, через 30 минут обнаруживается в дерме, а через 2-5 часов в подкожной жировой клетчатке.

Показания

Варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность, сопровождающаяся отечностью, болями, ощущением тяжести в ногах, поверхностный тромбофлебит, перифлебит, варикозный дерматит, боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях связок).

Способ применения и дозы

Наружно: гель наносят равномерно тонким слоем утром и вечером на кожу над болезненным участком и слегка массируют до полного всасывания. Доза препарата зависит от площади поврежденной поверхности, но не должна превышать 3-4 см геля (1,5-2 г). При необходимости гель можно наносить под окклюзионную повязку. Если через 6-7 дней ежедневного применения препарата симптомы заболевания ухудшаются или сохраняются, следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушения целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения препарата, детский возраст до 15 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Прием препарата ТРОКСЕРУТИН противопоказан в I триместре беременности. Лекарственный препарат можно применять во втором и третьем триместре беременности, а также в период кормления грудью.

Побочные действия

В отдельных случаях возможны аллергические реакции (гиперемия кожи, кожная сыпь, зуд, крапивница).

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препаратом при его местном применении не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время сведения о лекарственном взаимодействии препарата ТРОКСЕРУТИН в лекарственной форме гель отсутствуют.

Особые указания

Пациентам с хронической венозной недостаточностью рекомендуется применение как в начальных, гак и в поздних стадиях заболевания. При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта. Следует избегать попадания геля в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны. После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущими механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.