Инструкция по применению
Троксерутин Капсулы 300 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 300 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы № 1 желтого цвета. Содержимое капсулы - смесь гранул и порошка или уплотненная масса от светло-желтого до желтого с сероватым, зеленоватым или коричневатым оттенком цвета.

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

Состав на одну капсулу Действующее вещество Троксерутин - 300,0 мг Вспомогательные вещества Макрогол 6000 (полиэтиленгликоль 6000) - 12,0 мг Магния стеарат - 3,12 мг Капсулы твердые желатиновые № 1 Состав капсулы желатиновой Корпус Краситель солнечный закат желтый - 0,002 % Краситель хинолиновый желтый - 0,250 % Титана диоксид - 0,990 % Желатин - до 100 % Крышечка Краситель солнечный закат желтый - 0,002 % Краситель хинолиновый желтый - 0,250 % Титана диоксид - 0,990 % Желатин - до 100 %

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание После приема внутрь препарата с радиоактивной меткой абсорбция 14С-О-(#-гидроксиэтил)-рутозидов у человека составляет около 10-15 %. Максимальная концентрация в плазме крови (Cmax) достигается в пределах 1-9 часов. В течение 120 часов концентрации остаются определяемыми, снижение концентрации носит биоэкспоненциальный характер. Распределение Связь с белками плазмы крови составляет 27-29 %, в наибольших количествах накапливается в эндотелии. Не проникает через гематоэнцефалический барьер. Проникает через плацентарный барьер незначительно, в минимальных количествах выводится с грудным молоком. Биотрансформация Метаболизируется в основном посредством о-глюкуронирования в печени. Выведение Выводится в основном через кишечник и в меньшей степени почками.

Показания

Хроническая венозная недостаточность, посттромботический синдром, трофические нарушения при варикозной болезни и трофические язвы, в качестве вспомогательного лечения после склеротерапии вен и удаления варикозных узлов, геморрой (боль, экссудация, зуд и кровотечение), в качестве вспомогательного лечения ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и атеросклерозом.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством жидкости. При хронической венозной недостаточности и ее осложнениях, при симптоматическом лечении геморроя на начальном этапе лечения назначают по 1 капсуле (300 мг) 2-3 раза в сутки (600-900 мг) в зависимости от тяжести симптомов. Эффект обычно развивается в течение 2 недель. Лечение прекращают после исчезновения симптомов и отека. В случае повторного возникновения симптомов лечение возобновляют в той же дозе или снижают дозу - 1 капсула 2 раза в сутки (600 мг). Достигнутый эффект сохраняется на протяжении не менее 4 недель. Курс лечения составляет в среднем 3-4 недели. При диабетической ретинопатии препарат применяют в дозе 1800-3000 мг по 6-10 капсул (2 раза в сутки по 3-5 капсул (1800-3000 мг)). Курс лечения составляет в среднем 3-4 недели. Необходимость более длительного лечения определяется после консультации с врачом и индивидуально.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к рутозидам или к другим компонентам препарата, беременность (1 триместр), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит в фазе обострения, детский возраст до 18 лет (опыт клинического применения недостаточен), период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность Применение препарата в течение триместра беременности противопоказано. Возможность применения препарата во время II и III триместра беременности определяется врачом и возможно лишь в том случае, если предполагаемая польза лечения для матери превышает потенциальный риск для плода. В случае необходимости применения препарата во II и III триместрах беременности следует проконсультироваться с врачом. Период грудного вскармливания В минимальных количествах выводится с грудным молоком. Применение препарата в период грудного вскармливания не изучено.

Побочные действия

Частота возникновения нежелательных реакций приведена в соответствии с классификацией ВОЗ: очень часто (⩾1/10), часто (⩾1/100, Нарушения со стороны иммунной системы: очень редко - анафилактический шок, анафилактоидные реакции, реакции повышенной чувствительности (например, кожная сыпь). Нарушения со стороны нервной системы: очень редко - головная боль, головокружение. Нарушения со стороны сосудов: очень редко - гиперемия ("приливы" крови), экхимозы. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - тошнота, боль и дискомфорт в желудке, диспепсия, метеоризм, диарея, эрозивноязвенные поражения желудочно-кишечного тракта. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: редко - зуд, сыпь, крапивница. Прочие: очень редко - чувство усталости. В случае возникновения нежелательных реакций следует обратиться к врачу.

Передозировка

При передозировке возможно появление следующих симптомов: возбуждение, тошнота, головная боль и "приливы" крови к лицу. Лечение: необходимо промыть желудок, принять активированный уголь, при необходимости проводят симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет установленного лекарственного взаимодействия.

Особые указания

При лечении поверхностного тромбофлебита или тромбоза глубоких вен применение препарата не исключает необходимость назначения средств противовоспалительной и антитромботической терапии. Троксерутин неэффективен при отеках, вызванных сопутствующими заболеваниями печени, почек и сердца. Если в период применения препарата выраженность симптомов заболевания не уменьшается или симптомы заболевания утяжеляются, следует немедленно обратиться к врачу. Опыт применения препарата у детей в возрасте младше 18 лет недостаточен. При самостоятельном применении препарата не следует превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Прием препарата не оказывает влияния на двигательные и психические реакции, не препятствует управлению транспортными средствами и другими сложными механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.