Инструкция по применению
Троксерутин-Вертекс Капсулы 300 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 300 мг



Описание

Твердые желатиновые капсулы № 0 желтого цвета. Содержимое капсул - смесь гранул и порошка или уплотненная масса от желтого до зеленовато-желтого или коричневато-желтого цвета.

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

Действующим веществом является троксерутин. Каждая капсула содержит 300 мг троксерутина. Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат (см. раздел 2), тальк, кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. Капсулы твердые желатиновые содержат: титана диоксид, железа оксид желтый (железа оксид), желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Препарат Троксерутин ВЕРТЕКС применяется у взрослых в возрасте от 18 лет: при хронической венозной недостаточности, при посттромботическом синдроме, при трофических нарушениях при варикозной болезни и трофических язвах, в качестве вспомогательного лечения после склеротерапии вен и удаления варикозных узлов, при геморрое (боли, экссудации, зуде и кровотечении), в качестве вспомогательного лечения ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и атеросклерозом.

Способ применения и дозы

Прием препарата троксерутин ВЕРТЕКС Всегда принимайте препарат Троксерутин ВЕРТЕКС в полном соответствии с данным листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Рекомендуемая доза В начале лечения принимайте по 1 капсуле 2 или 3 раза в сутки. Эффект обычно развивается в течение 2 недель. Вы можете прекратить лечение после исчезновения симптомов и отека. В случае повторного возникновения симптомов, после консультации с врачом, можно возобновить прием препарата в той же дозе или по 1 капсуле 2 раза в сутки. Диабетическая ретинопатия Принимайте препарат по 3-5 капсул 2 раза в сутки. Путь и (или) способ введения Препарат Троксерутин ВЕРТЕКС следует принимать внутрь, во время еды. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая достаточным количеством воды. Продолжительность терапии Курс лечения составляет в среднем 3-4 недели. Для более длительного приема препарата Троксерутин ВЕРТЕКС, Вы должны проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Не принимайте препарат Троксерутин ВЕРТЕКС: если у Вас аллергия на троксерутин, рутозиды или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листке-вкладыша), если Вы беременны (I триместр), если у Вас язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, если у Вас хронический гастрит в фазе обострения, если Вы кормите грудью. Дети и подростки Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 18 лет в связи с тем, что данные об эффективности и безопасности препарата Троксерутин ВЕРТЕКС у данной группы пациентов отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Троксерутин ВЕРТЕКС проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Не принимайте препарат Троксерутин ВЕРТЕКС во время беременности (I триместр) и в период грудного вскармливания. Если Вам необходимо принимать препарат Троксерутин ВЕРТЕКС во время II или III триместра беременности проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Троксерутин ВЕРТЕКС может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. После приема лекарственного препарата Троксерутин ВЕРТЕКС могут возникнуть серьезные аллергические реакции, такие как анафилактический шок, анафилактоидные реакции. Такие реакции наблюдались очень редко (могут возникать у более чем 1 человека из 10 000). Прекратите прием препарата Троксерутин ВЕРТЕКС и немедленно обратитесь за медицинской помощью, в случае возникновения одного из следующих признаков аллергической реакции: затрудненное дыхание или глотание, головокружение, отек лица, губ, языка или горла, сильный зуд кожи, появление сыпи или волдырей. Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата троксерутин ВЕРТЕКС: Очень редко (могут возникать более чем у 1 человека из 10 000): реакции повышенной чувствительности (например, кожная сыпь), головная боль, головокружение, гиперемия ("приливы" крови), экхимозы (синяки), чувство усталости. Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000): тошнота, боль и дискомфорт в желудке, диспепсия, метеоризм, диарея, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, зуд, сыпь, крапивница. Сообщение о нежелательных реакциях Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств - членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Передозировка

Если Вы приняли препарат Троксерутин ВЕРТЕКС больше, чем следовало Если Вы приняли слишком много капсул Троксерутин ВЕРТЕКС, немедленно обратитесь к врачу или свяжитесь с ближайшим пунктом скорой помощи. Наиболее вероятными симптомами в случае передозировки являются возбуждение, тошнота, головная боль и "приливы" крови к лицу. При передозировке необходимо промыть желудок и принять активированный уголь. Если Вы забыли принять препарат Троксерутин ВЕРТЕКС Если Вы забыли принять очередную дозу следующую дозу в обычное время. Не принимайте двойную дозу препарата Троксерутин ВЕРТЕКС, чтобы компенсировать пропущенную дозу. При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. При одновременном применении усиливает действие аскорбиновой кислоты на резистентность (способность сохранять целость) и проницаемость сосудистой стенки.

Особые указания

Перед приемом препарата Троксерутин ВЕРТЕКС проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки: если у Вас почечная недостаточность (при длительном применении), если Вы беременны (II и III триместры). Троксерутин неэффективен при отеках, вызванных сопутствующими заболеваниями печени, почек и сердца. При самостоятельном приеме лекарственного препарата не следует превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы. При лечении поверхностного тромбофлебита или тромбоза глубоких вен применение препарата не исключает необходимость назначения средств противовоспалительной и антитромботической терапии.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Троксерутин ВЕРТЕКС не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Храните препарат в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.