Инструкция по применению
Троксерутин-МИК капсулы 200 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Беларусь
Производитель: МИНСКИНТЕРКАПС
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 200 мг



Описание

Капсулы твердью желатиновые № 1 цилиндрической формы с полусферическими концами желтого цвета. Содержимое капсул - аморфный порошок или подпрессованный столбик порошка, легко разрушаемый стеклянной палочкой, желтого цвета без запаха.

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

1 капсула содержит: Активное вещество: троксерутин - 200 мг Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат- 55,0 мг, крахмал картофельный - 32,1 мг, кальция стеарат - 2,9мг. Состав оболочки желатиновых капсул: желатин - 61,624 мг, глицерол - 0,193 мг, вода очищенная - 10,585 мг, натрия лаурилсульфат - 0,049 мг, титана диоксид - 0,497 мг, красители: хинолиновый желтый Е - 104 - 0,042 мг, солнечный закат желтый Е - 110 - 0,01 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

После приема внутрь абсорбция составляет около 10-15%. Максимальные концентрации в плазме крови достигаются в среднем через 2 часа после приема терапевтический уровень в плазме сохраняется в течение 8 часов. Метаболизируется в печени с образованием 2 метаболитов. Выводится почками и с желчью (11 % в неизмененном виде) в течение суток.

Показания

Варикозное расширение вен хроническая венозная недостаточность с такими проявлениями как статическая тяжесть в ногах язвы голени трофические поражения кожи поверхностный тромбофлебит перифлебит флеботромбоз язвы голеней дерматит геморрой посттромботический синдром диабетическая микроангиопатия ретинопатия геморрагический диатез(повышенная проницаемость капилляров) в т.ч. при кори скарлатине гриппе побочные сосудистые эффекты лучевой терапии посттравматический отек гематома профилактика осложнений после операций на венах.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь во время еды запивая достаточным количеством воды. Начальная доза - по 1 капсуле 3 раза в сутки, поддерживающая терапия - по 1 -2 капсулы в сутки. Курс лечения - 2-4 недели. Для смягчения побочных сосудистых эффектов лучевой терапии препарат назначают в более высоких дозах. Продолжительность лечения - до 2-х месяцев.

Противопоказания

Гиперчувствительность язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки хронический гастрит (в фазе обострения) беременность (I триместр) период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется назначать при беременности (I триместр) и в период грудного вскармливания. Применять препарат во II и III триместрах беременности следует только в случае если ожидаемая польза для матери преобладает над возможным риском для плода.

Побочные действия

В отдельных случаях возможны эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта аллергические реакции (кожная сыпь) головная боль.

Передозировка

Возможно появление следующих симптомов: возбуждение тошнота головная боль приливы крови к лицу. Лечение: необходимо промыть желудок принять активированный уголь. При необходимости начать симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.

Особые указания

Для того чтобы появился ожидаемый терапевтический результат необходимо строго соблюдать указания врача по дозировке и продолжительности лечения. Можно применять препарат в качестве одного из компонентов комплексного лечения. В частности при состояниях характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов и нарушением их структуры (при скарлатине гриппе кори аллергических реакциях) используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффектов. Не рекомендуется длительное использование пациентам с выраженными нарушениями функции почек.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.