Инструкция по применению
Троксерутин-Озон Гель 2% 40 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%



Описание

Однородный прозрачный гель от желтого до зеленовато-желтого цвета без запаха

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

100 г геля содержитАктивное вещество: троксерутин - 2,0 г.Вспомогательные вещества: динатрия эдетат - 0,05 г, троламин - 0,7 г, карбомер - 0,6 г, бензалкония хлорид - 0,0575 г, воды очищенной до 100 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При нанесении геля на кожу активное вещество быстро проникает через эпидермис через 30 минут обнаруживается в дерме а через 2-5 часов - в подкожной жировой клетчатке.

Показания

геморрой.

Способ применения и дозы

Применять наружно.Гель наносят утром и вечером на кожу в область поражения с помощью легких массирующих движений снизу вверх до его полного всасывания в кожу. Если по каким-либо причинам использование препарата пропущено пациент может нанести его в любое время соблюдая интервал между сеансами лечения не менее 10-12 часов.При необходимости гель можно наносить под окклюзионную повязку.Если через 6-7 дней симптомы заболевания ухудшаются или не проходят следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к троксерутину или какому-либо вспомогательному веществу препарата.Нарушение целостности кожных покровов.

Применение при беременности и кормлении грудью

Нет данных о нежелательном действии на плод и новорожденных. Лекарственный препарат можно применять во втором и третьем триместре беременности.

Побочные действия

В редких случаях наблюдаются аллергические реакции (покраснение кожных покровов зуд сыпь). Эти симптомы быстро проходят после прекращения лечения.

Передозировка

Случаи передозировки при местном применении не описаны.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет данных о взаимодействии троксерутина в данной лекарственной форме и других лекарственных средств.

Особые указания

Следует избегать попадания геля в глаза и на слизистые оболочки. После нанесения необходимо вымыть руки. Не наносить на открытые раны!Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Троксерутин не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 С в защищенном от света месте.Хранить в недоступном для детей месте.