Инструкция по применению
Троксерутин Гель для наружного применения 2% 40 г



Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%

Описание

Однородный прозрачный гель от желтого до светло-коричневого или желто-зеленого цвета.

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

Состав на 100 г: действующее вещество: троксерутин (в пересчете на 100% вещество) - 2,00 г, вспомогательные вещества: карбомер 940 - 0,6 г. динатрия эдетат - 0,050 г, бензалкония хлорид - 0,0575 г, натрия гидроксид 30% - 0,700 г, вода очищенная - до 100 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При нанесении геля на область поражения активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.

Показания

Варикозная болезнь, хроническая венозная недостаточность, сопровождающаяся отечностью, болями, ощущением тяжести в ногах, тромбофлебит, перифлебит, варикозный дерматит, боли и отеки после травм (ушибы, повреждение связок).

Способ применения и дозы

Наружно! Столбик геля длиной 4-5 см наносят тонким слоем на пораженные участки и легко втирают 3-4 раза в сутки до полного впитывания. Суточная доза не должна превышать 20 см геля. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки. Продолжительность лечения - не более 10 дней. Если симптомы заболевания ухудшаются или не проходят через 6-7 дней ежедневного применения препарата, следует обратиться к врачу, который назначит дальнейшее лечение и определит длительность курса терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Нарушение целостности кожных покровов. Детский возраст до 18 лет (опыт применения отсутствует).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность В доклинических исследованиях не отмечена тератогенность и фетотоксичность препаратов, содержащих троксерутин. В I триместре беременности применение лекарственного препарата троксерутин противопоказано в связи с отсутствием опыта клинического применения. Во II и III триместрах беременности применение препарата троксерутин возможно лишь в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Период грудного вскармливания Данные о проникновении троксерутина в грудное молоко отсутствуют. Препарат троксерутин не следует применять в период грудного вскармливания.

Побочные действия

В редких случаях наблюдаются аллергические кожные реакции - крапивница, экзема, дерматит. Эти симптомы быстро проходят после прекращения лечения.

Передозировка

Случаи передозировки при рекомендуемом методе применения препарата не известны. При случайном проглатывании препарата возможны ощущение жжения в полости рта, слюнотечение, тошнота, рвота. В таком случае показано промывание полости рта и желудка, при необходимости - симптоматическое лечение. При попадании в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны наблюдается местное раздражение - слезотечение, гиперемия, жжение, боль. Гель смывают большим количеством дистиллированной воды или изотонического раствора натрия хлорида до полного исчезновения или значительного уменьшения выраженности указанных симптомов.

Взаимодействие с другими препаратами

Нет сведений.

Особые указания

Гель наносят только на неповрежденную поверхность. Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки! При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене: Нет сведений.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работу с движущимися механизмами.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.