Инструкция по применению
Троксерутин-ТФФ Гель 2 % 40 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%



Описание

Гель ТРОКСЕРУТИН (TROXERUTIN) ТФФ - эффективное средство для лечения хронической венозной недостаточности.

Действующее вещество

Троксерутин

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

После приёма внутрь препарат абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в плазме отмечается в среднем через 2 часа после приема. Метаболизируется в печени, частично выводится в неизмененном виде с мочой и желчью.

Показания

Варикозное расширение вен, поверхностный тромбофлебит, трофические нарушения при хронической венозной недостаточности (дерматиты, трофические язвы), геморроидальные узлы.

Способ применения и дозы

Втереть в кожу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к троксерутину.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Особые указания

Троксерутин можно применять в качестве одного из компонентов комплексного лечения.

Срок хранения после открытия

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Беречь от детей