
Инструкция по применению
Троксевазин 2 % 100 г, гель

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Болгария
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Троксерутин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: Для алюминиевой тубы – 5 лет.. Для ламинатной (пластиковой) тубы – 5 лет.. Не использовать по истече



Описание

Гель от желтого до светло-коричневого цвета.

Действующее вещество

Троксерутин

Состав

100 г геля содержат: Действующее вещество: троксерутин 2,0 г; Вспомогательные вещества: карбомер 0,60 г, троламин (триэтаноламин) 0,70 г, динатрия эдетата дигидрат 0,05 г, бензалкония хлорид 0,10 г, вода очищенная 96,55 г. Описание: Гель от желтого до светло-коричневого цвета.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При нанесении геля на область поражения, активное вещество быстро проникает через эпидермис, через 30 мин обнаруживается в дерме, а через 2-5 ч в подкожной жировой клетчатке.

Показания

Варикозная болезнь. Хроническая венозная недостаточность с такими симптомами как: отечность и боли в ногах. Чувство тяжести, налитости, усталости ног. Сосудистые звездочки и сеточки, судороги, парестезии. Тромбофлебит. Перифлебит. Варикозный дерматит. Боли и отеки травматического характера (при ушибах, растяжениях, травмах).

Способ применения и дозы

Наружно. Гель наносят на область поражения 2 раза в стуки утром и вечером, мягко втирая до полного впитывания. При необходимости гель можно наносить под бинты или эластичные чулки. Успех лечения препаратом в большой степени зависит от его регулярного применения в течение длительного времени. Рекомендуется сочетать с приемом капсул Троксевазин для усиления воздействия. Если симптомы течения заболевания ухудшаются или не проходят через 6-7 дней ежедневного применения препарата, пациенту следует обратиться к врачу.

Противопоказания

* Повышенная чувствительность к препарату; * Нарушение целостности кожных покровов; * Детский возраст до 18 лет (опыт клинического применения недостаточен).

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность В I триместре беременности применение препарата противопоказано в связи с отсутствием опыта клинического применения. Во II и III триместрах беременности применение препарата возможно в случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Перед применением препарата во II и III триместрах беременности необходимо проконсультироваться с врачом. _Период грудного вскармливания_ Данные о проникновении троксерутина в грудное молоко отсутствуют. Препарат не следует применять в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Нарушения со стороны иммунной системы: редко - крапивница, экзема, дерматит. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки при местном применении троксерутина не описаны. При случайном проглатывании большого количества геля необходимо провести общие меры выведения препарата из организма (рвотные средства) и обратиться к врачу. При наличии показаний проводится перитонеальный диализ. При передозировке препарата необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время данные о лекарственном взаимодействии препарата Троксевазин отсутствуют.

Особые указания

Гель наносят только на неповрежденную поверхность. Избегать попадания на открытые раны, глаза и слизистые оболочки. При состояниях, характеризующихся повышенной проницаемостью сосудов (в т.ч. при скарлатине, гриппе, кори, аллергических реакциях), гель используют в сочетании с аскорбиновой кислотой для усиления ее эффекта. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Троксевазин гель не оказывает влияния на способность управлять автотранспортным средством и работать с движущимися механизмами.

Условия хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Не замораживать.