Инструкция по применению
Тромблесс Гель для наружного применения 1000 ед/г 50 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гепарин натрия
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1000 МЕ/г
Срок годности: 36

Описание

Бесцветный или со слабым желтоватым оттенком прозрачный гель с характерным запахом

Действующее вещество

Гепарин натрия

Состав

Состав на 1 г препарата: действующее вещество: гепарин натрия — 1000 МЕ (8,33 мг при активности гепарина натрия 120 МЕ/мг), вспомогательные вещества: этанол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, диэтаноламин, карбомер, вода очищенная — до 1 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Незначительное количество гепарина абсорбируется с поверхности кожи в системный кровоток. Максимальная концентрация препарата в крови отмечается через 8 часов после аппликации. Выведение гепарина, в основном, происходит через почки, период полувыведения 12 часов. Троксерутин хорошо всасывается с поверхности кожи при наружном применении, проникновение в системный кровоток клинически незначимо. Декспантенол при местном применении быстро абсорбируется кожей и превращается в пантотеновую кислоту. Концентрация ее в крови — 0,5-1 мг/л, в сыворотке крови — 100 мкг/л. Пантотеновая кислота не подвергается в организме метаболизму (кроме включения в коэнзим А), выводится в неизмененном виде. Бензокаин при накожном нанесении практически не абсорбируется. Оказывает моментальный обезболивающий эффект: скорость наступления эффекта начинается через 1 секунду после нанесения и продолжается в среднем 4-6 часов.

Показания

Тромбофлебиты поверхностных вен, локализованные инфильтраты и отеки мягких тканей, подкожные гематомы (в том числе гематомы после флебэктомии), травмы и ушибы суставов, сухожилий, мышечной ткани.

Способ применения и дозы

Наружно. Столбик геля длиной 3-10 см легкими втирающими движениями наносят на кожу над пораженным участком 1-3 раза в сутки. Гель применяют ежедневно, в среднем от 3 до 7 дней. Длительность лечения определяется врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, язвенно-некротические, гнойные процессы на коже, травматическое нарушение целостности кожных покровов, повышенная склонность к кровоточивости, тромбоцитопения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации, если потенциальная польза для матери превосходит риск для плода и ребенка.

Побочные действия

При длительном применении препарата возможны местные реакции в виде гиперемии кожи, аллергических реакций.

Передозировка

В связи с малой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместное применение геля с непрямыми антикоагулянтами может вызвать удлинение протромбинового времени. Гель не назначают местно одновременно с нестероидными противовоспалительными препаратами, тетрациклинами, антигистаминными лекарственными средствами.

Особые указания

Препарат не следует применять при кровотечениях, а также на открытых ранах, на слизистых оболочках и при гнойных процессах.

Условия хранения

В сухом месте