Инструкция по применению
Тромбовазим капсулы 800 ед N30

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Оболенское ФП
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тромбовазим
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 800 ЕД
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Тромбовазим

Состав

В 1 капсуле содержится: комплекс протеиназ, продуцируемых Bacillus subtilis, иммобилизованных радиационным способом на макроголе 1500 с добавлением декстрана (Тромбовазим;) 800 ЕД. Вспомогательные вещества: крахмал картофельный - 261 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 120 мг, натрия хлорид - 9 мг. Состав желатиновой капсулы: красители - азорубин (Е122), патент синий V (Е131), титана диоксид (Е171); желатин.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

ВсасываниеПри приеме препарата внутрь биодоступность составляет 16-18%. Максимальный эффект наступает через 6 ч.РаспределениеС белками плазмы и форменными элементами крови не связывается.Не накапливается в организме при соблюдении рекомендуемых доз и кратности приема.Метаболизм и выведениеТ1/2 препарата при измерении специфической активности в крови составляет 12 мин. Общий клиренс составляет 1.2 мл/мин, константа скорости элиминации при однократном приеме составляет 0.057 мин-1. Выводится в основном почками (80%). Частично метаболизируется и выводится печенью (около 20%).

Показания

В качестве вспомогательного средства в комплексной терапии хронической венозной недостаточности.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь за 30-40 мин до еды в дозе 800-1600 ЕД в сут в 2 приема. Максимальная суточная доза - 2000 ЕД. Курс лечения 20 дней. При отсутствии эффективности в течение курса лечения пациент должен обратиться к врачу. При необходимости возможно проведение повторных курсов по рекомендации врача.

Противопоказания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; беременность; лактация; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); одновременный прием с лекарственными средствами, содержащими соли двухвалентных металлов (кальция, магния, цинка, железа) и антибиотиками тетрациклинового ряда (тетрациклин, хлортетрациклина гидрохлорид и окситетрациклина гидрохлорид); повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Передозировка

Случаев передозировки препарата Тромбовазим; не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Гепарин, дипиридамол, ацетилсалициловая кислота усиливает антитромботический эффект, не повышая угрозу кровотечения.Применение с антибиотиками тетрациклинового ряда (тетрациклин, хлортетрациклина гидрохлорид и окситетрациклина гидрохлорид) усиливает эффект фибринолитиков.При необходимости применения препаратов, содержащих соли двухвалентных металлов (кальция, магния, цинка, железа) в связи с возможным уменьшением активности ферментов желательно соблюдать интервал между приемами препарата Тромбовазим; и указанных препаратов как минимум 40 мин.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиИсследования о возможном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились, т.к. препарат и его компоненты не относятся к веществам, способным влиять на психомоторное состояние человека.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении