Инструкция по применению
Тыквеол Масло для приема внутрь 100мл

Характеристики



Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: ЕВРОПА-БИОФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тыквы обыкновенной семян масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Тыквы обыкновенной семян масло

Состав

1 капсула содержит:масло семян тыквы 100 мл.

Форма выпуска

Масло

Фармакокинетика

Действие препарата Тыквеол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Для приема внутрь:— цирроз печени;— хронический гепатит;— жировая дегенерация печени;— инфекционный гепатит;— токсические поражения печени (лекарственными средствами, промышленными ядами, алкоголем);— холецистит (некалькулезный);— холестаз;— дискинезия желчевыводящих путей;— гастрит;— колит, энтероколит (неинфекционного генеза);— геморрой;— атеросклероз;— простатит;— доброкачественная гиперплазия предстательной железы.Для ректального применения: — хронический простатит;— доброкачественная гиперплазия предстательной железы I-II стадии с сопутствующим простатитом.Для наружного и местного применения:— герпес;— дерматит;— псориаз;— экзема;— ожоги и ожоговая болезнь;— эрозия шейки матки;— кольпит, эндоцервицит;— заболевания пародонта.

Способ применения и дозы

Внутрь назначают препарат за 30 мин до еды по 1 чайной ложке масла 3-4 раза/сут в течение 1-3 мес или по 4 капсулы 3 раза/сут во время или после еды.При наружном и местном применении смазывают пораженные участки 2-3 раза/сут.При геморрое и простатите (наряду с пероральным применением) назначают микроклизмы 2 раза/сут. При пародонтозе назначают местные аппликации препарата.В гинекологической практике применяют вагинальные тампоны, пропитанные препаратом в дозе 10 мл. Суппозитории ректальные вводят в прямую кишку (предварительно смочив водой) по 1 супп. 1-3 раза/сут. Курс лечения составляет от 10 дней до 3 мес, или проводят короткие курсы лечения по 10-15 дней на протяжении 6 мес.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинические данные об эффективности и безопасности применения Тыквеола при беременности и в период лактации отсутствуют.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - диспепсия, диарея.Прочие: аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: диарея.Лечение: необходимо снизить дозу препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия Тыквеола с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

В случае развития побочных эффектов необходимо снизить дозу препарата.Тыквеол применяют как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии.Препарат совместим с любыми пищевыми продуктами.При воспалительных и дегенеративных процессах слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ рекомендуют принимать Тыквеол в форме масла, следует избегать приема препарата в форме капсул. Использование в педиатрииКлинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении