Инструкция по применению
Тыквеол и к масло 100мл

Характеристики



Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: ЕВРОПА-БИОФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тыквы обыкновенной семян масло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Тыквы обыкновенной семян масло

Состав

Действующее вещество: Масло семян тыквыКонцентрация действующего вещества (мг): 100

Форма выпуска

Масло

Фармакокинетика

Действие препарата Тыквеол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Гепатит, жировая дистрофия печени, цирроз печени, холестаз, дискинезия желчевыводящих путей, лечение после операций в области гепатобилиарной зоны, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, дуоденит, колит, геморрой, атеросклероз, нарушения липидного обмена различного генеза, хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы 1-й и 2-й стадий.Местно: герпес, дерматит, диатез, псориаз, экзема, ожоги и ожоговая болезнь, раны, в т.ч. огнестрельные, эрозия шейки матки, эндоцервицит, заболевания пародонта, гингивит, стоматит.Ректально: доброкачественная гиперплазия предстательной железы (профилактика и лечение 1-й и 2-й стадии аденомы), хронический простатит, сексуальные расстройства при простатите, геморрой, трещины и экзема анальной области, перианит, до- и после операционное лечение в проктологии.

Способ применения и дозы

Внутрь: по 1 ч. ложке за 30 мин. до еды или по 4 капсулы во время или после еды 3-4 раза в сутки в течение 1-3 мес.; наружно: смазывать пораженные участки 2-3 раза в сутки;Ректально: при геморрое и простатите (наряду с внутренним применением) - микроклизмы: 5 мл препарата вводят в задний проход через день (после процедуры больной должен полежать 10-15 мин.) или 1 суппозиторий 1 раз в сутки на ночь; в гинекологии - вагинальные тампоны 2 раза в сутки; при пародонтозе - аппликации; в урологической и проктологической практике - по одному суппозиторию 1-3 раза в сутки в течение 10-15 дней и более до 4-х недель.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинические данные об эффективности и безопасности применения Тыквеола при беременности и в период лактации отсутствуют.

Побочные действия

Диспепсия, диарея (требуется снижение доз).

Передозировка

Симптомы: диарея.Лечение: необходимо снизить дозу препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия Тыквеола с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

В случае развития побочных эффектов необходимо снизить дозу препарата.Тыквеол применяют как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии.Препарат совместим с любыми пищевыми продуктами.При воспалительных и дегенеративных процессах слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ рекомендуют принимать Тыквеол в форме масла, следует избегать приема препарата в форме капсул. Использование в педиатрииКлинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.

Условия хранения

В сухом месте