Инструкция по применению
Тыквеол Капсулы 450 мг 150 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ЕВРОПА-БИОФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тыквы обыкновенной семян масло
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 450 мг

Описание

Мягкие желатиновые капсулы, овальной формыс продольным швом, заполненными маслянистой жидкостью от зеленовато-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Тыквы обыкновенной семян масло

Состав

Тыквеол - 450 мг Оболочка капсулы: желатин медицинский, глицерол, сорбитол, вода очищенная.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Гиперлипидемия IIa и IIb типа Атеросклероз (профилактика) Хронический гепатит гепатит А (в комплексной терапии) Токсическое поражение печени Цирроз печени Жировая дистрофия печени Холецистохолангит Дискинезия желчного пузыря и желчных путей Гиперплазия предстательной железы Хронический простатит

Способ применения и дозы

Внутрь. При гиперплазии предстательной железы по 1-2 капсуле 3 раза в сутки в течение 3-4 месяцев, при хроническом простатите по 1-2 капсуле 3 раза в сутки в течение от 10 дней до 3 месяцев, при гиперлипидемии - по 1-2 капсулы 3 раза в сутки в течение 3-4 месяцев, для профилактики атеросклероза - по 1-2 капсулы в сутки в течение длительного времени, при диффузных поражениях печени хроническом холецистите дискинезии желчевыводящих путей - внутрь по 3-4 капсулы 3 раза в день в день после еды длительность лечения не менее 3-4 недель. Меры предосторожности при применении При приеме нет каких-либо ограничений если иное не рекомендовано вашим врачом. Не допускать передозировки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Детский возраст (до 12 лет). Холелитиаз. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения).

Применение при беременности и кормлении грудью

В настоящее время нет данных о влиянии препарата Тыквеол® капсулы на организм беременных женщин и в период лактации.

Побочные действия

Возможно учащение стула. В этом случае следует уменьшить дозу препарата. Возможны аллергические реакции при которых приём препарата прекращают.

Передозировка

Диарея. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не обнаружено клинически значимого взаимодействия препарата Тыквеол® с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами механизмами.

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять по истечении срока годности указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25°С. Хранить лекарственный препарат в местах недоступных для детей.