Инструкция по применению
Тыквеол Капсулы 450 мг 84 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: ЕВРОПА-БИОФАРМ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Тыквы обыкновенной семян масло
Количество в упаковке: 84
Дозировка действующего вещества: 450 мг
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Тыквы обыкновенной семян масло

Состав

1 капсула содержит: масло семян тыквы 450 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Действие препарата Тыквеол является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

Для приема внутрь: — цирроз печени; — хронический гепатит; — жировая дегенерация печени; — инфекционный гепатит; — токсические поражения печени (лекарственными средствами, промышленными ядами, алкоголем); — холецистит (некалькулезный); — холестаз; — дискинезия желчевыводящих путей; — гастрит; — колит, энтероколит (неинфекционного генеза); — геморрой; — атеросклероз; — простатит; — доброкачественная гиперплазия предстательной железы.; Для ректального применения: — хронический простатит; — доброкачественная гиперплазия предстательной железы I-II стадии с сопутствующим простатитом.; Для наружного и местного применения: — герпес; — дерматит; — псориаз; — экзема; — ожоги и ожоговая болезнь; — эрозия шейки матки; — кольпит, эндоцервицит; — заболевания пародонта.

Способ применения и дозы

Внутрь назначают препарат за 30 мин до еды по 1 чайной ложке масла 3-4 раза/сут в течение 1-3 мес или по 4 капсулы 3 раза/сут во время или после еды.; При наружном и местном применении смазывают пораженные участки 2-3 раза/сут.; При геморрое и простатите (наряду с пероральным применением) назначают микроклизмы 2 раза/сут.; При пародонтозе назначают местные аппликации препарата.; В гинекологической практике применяют вагинальные тампоны, пропитанные препаратом в дозе 10 мл.; Суппозитории ректальные вводят в прямую кишку (предварительно смочив водой) по 1 супп. 1-3 раза/сут. Курс лечения составляет от 10 дней до 3 мес, или проводят короткие курсы лечения по 10-15 дней на протяжении 6 мес.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинические данные об эффективности и безопасности применения Тыквеола при беременности и в период лактации отсутствуют.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: редко - диспепсия, диарея.; Прочие: аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: диарея.; Лечение: необходимо снизить дозу препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия Тыквеола с другими лекарственными препаратами не установлено.

Особые указания

В случае развития побочных эффектов необходимо снизить дозу препарата.; Тыквеол применяют как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии.; Препарат совместим с любыми пищевыми продуктами.; При воспалительных и дегенеративных процессах слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ рекомендуют принимать Тыквеол в форме масла, следует избегать приема препарата в форме капсул.; Использование в педиатрии;Клинические данные об эффективности и безопасности применения препарата у детей отсутствуют.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении