Инструкция по применению
Убихинон Композитум Раствор 2,2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5
Срок годности: 60

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма, интоксикационного синдрома (в том числе кахексия, инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием), нарушений обмена веществ (в том числе атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или относительного дефицита ферментов, витаминов, гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса, последствий химио- и лучевой терапии.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)) Активные компоненты: Ubichinonum (Убихинонум) D10 22 мкл, Acidum ascorbicum (Ацидум аскорбикум) D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum (Тиаминум гидрохлорикум) D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum (Натриум рибофлавинум фосфорикум) D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum (Pyridoxinhydrochlorid) (Пиридоксинум гидрохлорикум (Пиридоксингидрохлорид)) D6 22 мкл, Nicotinamidum (Никотинамидум) D6 22 мкл, Vaccinium myrtillus (Myrtillus) (Ваччиниум миртиллюс (Миртиллюс)) D4 22 мкл, Colchicum autumnale (Colchicum) (Колхикум отумнале (Колхикум)) D4 22 мкл, Podophyllum peltatum (Podophyllum) (Подофиллюм пельтатум (Подофиллюм)) D4 22 мкл, Conium maculatum (Conium) (Кониум макулятум (Кониум)) D4 22 мкл, Hydrastis canadensis (Hydrastis) (Гидрастис канаденсис (Гидрастис)) D4 22 мкл, Acidum sarcolacticum (Ацидум сарколяктикум) D6 22 мкл, Hydrochinonum (Гидрохинонум) D8 22 мкл, Acidum DL-alpha-liponicum (Acidum alpha-liponicum) (Ацидум ДЛ-альфа-липоникум (Ацидум альфа-липоникум)) D8 22 мкл, Sulfur (Сульфур) D8 22 мкл, Manganum phosphoricum (Манганум фосфорикум) D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum (Natriumdiethyloxalacetat) (Натриум диэтилоксалацетикум (Натриумдиэтилоксалацетат)) D8 22 мкл, Trichinoylum (Трихиноилюм) D10 22 мкл, Anthrachinonum (Антрахинонум) D10 22 мкл, Naphthochinonum (Нафтохинонум) D10 22 мкл, para-Benzoicum (пара-Бензоикум) D10 22 мкл, Adenosinum triphosphoricum (Аденозинум трифосфорикум) D10 22 мкл, Coenzym A (Коэнзим А) D10 22 мкл, Galium aparine (Галиум апарине) D6 22 мкл, Acidum acetylosalicylicum (Ацидум ацетилосалициликум) D10 22 мкл, Histamine (Histaminum) (Гистамин (Гистаминум)) D10 22 мкл, Nadidum (Надидум) D10 22 мкл, Magnesium gluconicum (Магнезиум глюконикум) D10 22 мкл. вспомогательные вещества: вода для инъекций 1584 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма, интоксикационного синдрома (в том числе кахексия, инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием), нарушений обмена веществ (в том числе атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или относительного дефицита ферментов, витаминов, гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса, последствий химио- и лучевой терапии.

Способ применения и дозы

Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю. Курс лечения 2-8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беремен-ность, период лактации, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Условия хранения

В сухом месте