Инструкция по применению
Ультоп Капсулы 40 мг 14 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: KPKA
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Омепразол
Количество в упаковке: 14
Дозировка действующего вещества: 40 мг



Описание

Капсулы Ультоп - это ингибирующее средство.

Действующее вещество

Омепразол

Состав

Омепразол - 40 мг. Вспомогательные вещества: сахарная крупка (сахароза, патока крахмальная) - 160 мг, гипролоза - 9.6 мг, гидроксикарбонат магния (карбонат магния, тяжелый) - 40 мг, сахароза - 64.4 мг, крахмал кукурузный - 53 мг, натрия лаурилсульфат - 5 мг, сополимер метакриловой кислоты и этилакрилата (1:1) 30% дисперсия - 62 мг, тальк - 12 мг, макрогол 6000 - 6.2 мг, диоксид титана - 3.8 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Всасывание и распределение. После приема препарата внутрь омепразол быстро абсорбируется из ЖКТ, Cmax в плазме достигается через 0.5-1 ч. Биодоступность составляет 30-40%. Связывание с белками плазмы – около 90-95%.Метаболизм и выведение. Омепразол практически полностью биотрансформируется в печени. Является ингибитором ферментной системы CYP 2C19. Выводится в основном почками (70-80%) и с желчью (20-30%). T1/2 - 0.5-1 ч.Фармакокинетика в особых клинических случаях. При хронической почечной недостаточности выведение снижается пропорционально снижению КК. У лиц пожилого возраста выведение омепразола снижается. При печеночной недостаточности T1/2 - 2-3 ч.

Показания

Кратковременная терапия неязвенной диспепсии, длительная поддерживающая терапия с целью профилактики рецидивов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, длительная поддерживающая терапия с целью профилактики рецидивов язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, до еды (т.к. прием пищи замедляет всасывание препарата), запивая небольшим количеством воды (содержимое капсулы нельзя разжевывать).

Противопоказания

Детский возраст, беременность, лактация (грудное вскармливание), наследственная непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, дефицит сахаразы/изомальтазы, повышенная чувствительность к компонентам препарата. С осторожностью следует назначать препарат при почечной или печеночной недостаточности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не следует применять Ультоп при беременности. При необходимости назначения препарата в период лактации необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

В редких случаях могут возникать обычно обратимые побочные реакции.

Передозировка

Симптомы: боль в животе, сонливость, головная боль, головокружение, сухость во рту, тахикардия, аритмия, нечеткость зрения, возбуждение, спутанность сознания, повышение потоотделения, тошнота, в редких случаях — судороги, одышка, гипотермия. Специфического антидота не существует. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Длительное применение омепразола в дозе 20 мг 1 раз/сут в комбинации с кофеином, теофиллином, пироксикамом, диклофенаком, напроксеном, метопрололом, пропранололом, этанолом, циклоспорином, лидокаином, хинидином и эстрадиолом не приводило к изменению их концентрации в плазме. Не отмечено взаимодействия омепразола с одновременно принимаемыми антацидами. Омепразол может снижать абсорбцию эфиров ампициллина, солей железа, итраконазола и кетоконазола (т.к. омепразол повышает pH желудка). Являясь ингибитором цитохрома P450, омепразол может повышать концентрацию и снижать выведение диазепама, антикоагулянтов непрямого действия, фенитоина, что в некоторых случаях может потребовать уменьшения доз этих лекарственных средств. При одновременном приеме усиливается всасывание омепразола и кларитромицина.