Инструкция по применению
Ультра-адсорб Капсулы 200 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Испания
Производитель: Санта
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Активированный уголь
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 200 мг
Срок годности: 36.0



Описание

Твердые желатиновые капсулы, № 1, корпус черного цвета, крышечка черного цвета, содержимое капсулы - черный блестящий порошок без запаха.

Действующее вещество

Активированный уголь

Состав

Одна капсула содержит: 200 мг активированного угля, а также вспомогательные вещества: желатин - 73,18 мг, титана диоксид (Е171) - 0,15 мг, железа оксид черный (Е172) - 1,67 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

В качестве энтеросорбирующего средства для дезинтоксикации при экзо и эндогенных интоксикациях: Метеоризме, Диспепсии, Процессах гниения, брожения, гиперсекреция слизи и желудочного сока: Диарее. Отравлениях химическими соединениями и лекарственными средствами (в т.ч. фосфорорганическими и хлорорганическими соединениями, психоактивными лекарственными средствами), Отравлениях алкалоидами, гликозидами, солями тяжелых металлов, Пищевой интоксикации, пищевой токсикоинфекции, дизентерии, сальмонеллезе, Абстинентном алкогольном синдроме. В качестве энтеросорбирующего средства в комплексной терапии препарат показан при: Ожоговой болезни в стадии токсемии и септикотоксемии, Почечной недостаточности, Хроническом гепатите, остром вирусном гепатите, циррозе печени, Атопическом дерматите, Бронхиальной астме, Гастрите, хроническом холецистите, энтероколите, холецистопанкреатите, Лечении аллергических заболеваний, Лечении нарушения обмена веществ, Лечении интоксикации у онкологических больных на фоне лучевой и химиотерапии, Подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям (для уменьшения содержания газов в кишечнике).

Способ применения и дозы

Капсулы принимать внутрь с небольшим количеством воды за 1 -2 часа до или через 1 -2 часа после приема пищи и других лекарственных средств. Не следует использовать для запивания другие напитки (кофе, чай, соки и др.), так как они снижают эффективность препарата. При диспепсии, метеоризме взрослым - от 5 до 10 капсул (1-2 г) 3-4 раза в сутки. Курс лечения 3 -7 дней. Курс лечения при заболеваниях, сопровождающихся процессами брожения и гниения в кишечнике, повышенной секрецией желудочного сока, продолжается 1-2 недели. Взрослым - по 10 -16 капсул до 3 раз в сутки (до 10 г). Детям 7-14 лет - 2 - 3 капсулы на прием, до 4 - 5 раз в день (до 7 г). Детям от 3 до 7 лет -1 - 3 капсулы 2 раза в день (до 5 г) или по назначению врача.

Противопоказания

Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в т.ч. язвенная болезнь желудка и 12 - перстной кишки, язвенный колит), кровотечения из ЖКТ. Детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При беременности и лактации обязательно проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать Ультра - Адсорб.

Побочные действия

Диспепсия, запоры или диарея, при длительном применении - гиповитаминоз, снижение всасывания из ЖКТ питательных веществ (жиров, белков), гормонов. Длительное применение, а также прием больших доз Ультра - Адсорба может повлиять на пищеварение и обмен веществ, так как препарат адсорбирует ферменты, витамины и минеральные вещества.

Взаимодействие с другими препаратами

Снижает эффективность одновременно принимаемых лекарственных средств, в т.ч. антитоксических ЛС, эффект которых развивается после всасывания (метионин и др.). Уменьшает эффективность лекарственных средств, действующих на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (в т.ч. ипекакуаны и термопсиса).

Особые указания

При лечении интоксикаций необходимо создать избыток угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации угля в среде способствует десорбции связанного вещества и его всасыванию (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение угля). Наличие пищевых масс в желудочно-кишечном тракте требует введения активированного угля в высоких дозах, т.к. содержимое ЖКТ сорбируется углем и его активность снижается. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и др. опиаты), необходимо применять уголь в течение несколько дней. При использовании препарата более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция (только под контролем врача). Ультра - Адсорб следует хранить отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность угля. Применение Ультра - Адсорба может привести к окрашиванию стула в черный цвет, что не является клиническим симптомом.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:

Условия хранения

В сухом месте