Инструкция по применению
Ультрапрокт суппозитории ректальные N10

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Италия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Флуокортолон
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 1.242 мг+1 мг
Срок годности: 24

Действующее вещество

Флуокортолон

Состав

В 1 суппозитории: активное вещество: флуокортолона гексонат 0,630 мг, флуокортолона пивалат 0,612 мг, цинхокаина гидрохлорид 1 мг. Вспомогательные вещества: твердый жир (Витепсол W35) - 1797,758 мг

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

ВсасываниеФлуокортолона пивалат и флуокортолона гексаноат, имеющие различную липофильность и молекулярный вес, диффундируют с различной скоростью, что обеспечивает быстрое начало действия и большую продолжительность. МетаболизмФлуокортолон гидролизуется эстеразами, ферментами очага воспаления, с образованием флуокортолона, 11-кетофлуокортолона и триметилуксусной кислоты. ВыведениеT1/2 флуокортолона и его метаболитов после ректального введения составляет 1.3 и 4 ч соответственно. Флуокортолон выводится в виде метаболитов, преимущественно почками

Показания

- геморрой;- поверхностные анальные трещины;- проктит.

Способ применения и дозы

Перед применением Ультрапрокта следует провести гигиену ануса. Рекомендуется применять Ультрапрокт после дефекации. Обычно наступает быстрое улучшение, однако во избежание рецидивов следует продолжать лечение еще, по крайней мере, в течение 1 недели, но с меньшей частотой применения (мазь – 1 раз/сут или 1 суппозиторий через день), даже при полном исчезновении симптомов. Длительность лечения, по возможности, не должна превышать 4 недели. Суппозитории вводят глубоко в прямую кишку, как правило, по 1 шт. ежедневно. При тяжелом течении заболевания в первый день вводят по 1 суппозиторию 2-3 раза/сут. При наличии сильно воспаленных, болезненных георроидальных узлов рекомендуется начинать лечение с мази. Выступающие геморроидальные узлы следует густо смазать мазью и осторожно вдавить пальцем обратно. Если под воздействием тепла свечи размягчились, то их следует поместить в холодную воду, не снимая упаковки, тогда они снова примут свою прежнюю форму.

Противопоказания

- проявления туберкулеза, сифилиса в области нанесения препарата;- проявления вирусных заболеваний (например, ветряная оспа, реакция на вакцинацию) в области нанесения препарата;- I триместр беременности;- повышенная чувствительность к компонентам препарата. Применение у детей и подростков не рекомендовано, в связи с отсутствием клинических данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Ряд эпидемиологических исследований предполагает возможный повышенный риск развития волчьей пасти у новорожденных, матери которых получали ГКС в I триместре беременности. Данных по использованию местных ГКС при беременности накоплено недостаточно, однако в этом случае вероятность неблагоприятного воздействия очень низка в связи с минимальной бидоступностью ГКС при местном применении. Ультрапрокт следует назначать с осторожностью во II и III триместрах беременности. При назначении беременным или кормящим женщинам необходимо сопоставлять ожидаемую пользу лечения для матери с возможным риском для плода и ребенка. При назначении Ультрапрокта при беременности и в период лактации препарат должен использоваться непродолжительное время.

Побочные действия

Возможны: жжение, кожный зуд, сухость кожи. При длительном применении (более 4 недель) возможны атрофия кожи, телеангиэктазии, гипопигментация. Редко: аллергические реакции.

Передозировка

В соответствии с результатами исследований острой токсичности сложных эфиров флуокортолона и цинхокаина гидрохлорида маловероятно проявление острой интоксикации при однократном ректальном или перианальном применении Ультрапрокта даже при случайной передозировке. При случайном приеме препарата внутрь (например, при проглатывании нескольких граммов мази или нескольких суппозиториев) возможно развитие преимущественно симптомов побочного действия цинхокаина гидрохлорида соматического характера, которые в зависимости от дозы, могут проявляться как в виде тяжелых сердечно-сосудистых нарушений (снижение сердечной деятельности вплоть до остановки сердца), так и в виде нарушений со стороны ЦНС (судороги, угнетение дыхательной функции вплоть до остановки дыхания).

Взаимодействие с другими препаратами

При проведении клинических испытаний и применении препарата в медицинской практике не выявлено взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами.

Особые указания

При наличии грибковых инфекций необходимо проведение дополнительной противогрибковой терапии. Необходимо избегать попадания препарата внутрь или контакта с глазами. После применения рекомендуется тщательно вымыть руки. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНе выявлено.

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении