Инструкция по применению
Ундевит Фармстандарт драже 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Драже желто-оранжевого цвета правильной шарообразной формы с характерным запахом. Поверхность драже должна быть ровной, гладкой, однородной по окраске.

Состав

1 драже содержит: активные вещества: ретинола пальмитат (витамин А) (в виде раствора ретинола пальмитата в подсолнечном масле, стабилизированного бутилгидрокситолуолом, в пересчете на 100% вещество) 1,817 мг (3300 МЕ), α-токоферола ацетат (витамин Е) 10,00 мг, тиамина гидрохлорид (витамин В1) 2,00 мг, рибофлавин (витамин В2) 2,00 мг, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) 3,00 мг, аскорбиновая кислота (витамин С) 75,00 мг, никотинамид 20,00 мг, фолиевая кислота 0,07 мг, рутозид (рутин) 10,0 мг, кальция пантотенат 3,0 мг, цианокобаламин (витамин В12) 2,00 мкг, вспомогательные вещества: воск пчелиный 0,20 мг, подсолнечника масло 0,28 мг, ароматизатор апельсиновый 0,10 мг, мука пшеничная 55,00 мг, патока крахмальная 65,00 мг, тальк 0,56 мг, сахароза (сахар) 751,971 мг.

Форма выпуска

Драже

Показания

Профилактика и лечение гиповитаминоза. Состояние повышенной потребности в витаминах (в пожилом и старческом возрасте, при антибиотикотерапии, в период выздоровления после перенесенных заболеваний, при повышенных физических и умственных нагрузках).

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, после еды. Взрослым, в профилактических целях - по 1 драже 2-3 раза в сутки, в лечебных целях - по 2 драже 3 раза в сутки. Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца. Повторные курсы по рекомендации врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Не превышайте рекомендованной суточной дозы, при случайном приеме высоких доз немедленно обратитесь к врачу.

Передозировка

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение: временное прекращение приема препарата, промывание желудка, прием активированного угля внутрь, симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Особые указания

Возможное окрашивание мочи в желтый цвет, что объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.