Инструкция по применению
Ундевит драже Алтайвитамины 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Драже
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины
Количество в упаковке: 50



Описание

Драже шарообразной формы желто-оранжевого цвета со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Поливитамины

Состав

1 драже содержит:Активные субстанции:Аскорбиновая кислота 0,075000 г, Никотинамид 0,020000 г,Альфа-токоферола ацетат (витамин Е) 0,010000 г,Рутин 0,010000 г,Кальция пантотенат 0,003000 г,Пиридоксина гидрохлорид 0,003000 г, Тиамина гидрохлорид 0,002000 г,Рибофлавин 0,002000 г,Ретинола пальмитат (витамин А) 0,001817 г (3300 МЕ)Фолиевая кислота 0,000070 г,Цианокобаламин 0,000002 г,Вспомогательные вещества:Сахароза (сахар) 0,772612 г,Патока крахмальная 0,049350 г,Мука пшеничная 0,049200 г,Тальк 0,001380 г,Подсолнечника масло 0,000260 г,Воск пчелиный 0,000260 г,Ароматизатор пищевой "Апельсин 508" 0,000049 г,Масса драже: 1,000 г

Форма выпуска

Драже

Показания

Применяют для профилактики и лечения гиповитаминоза развивающегося на фоне перечисленных состояний: при применении антибиотиков в период выздоровления после перенесенных заболеваний при повышенных физических и умственных нагрузках, для улучшения обмена веществ в пожилом и старческом возрасте.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь после еды.С целью профилактики гиповитаминозов рекомендуется взрослым по 1 драже в сутки.В период выздоровления для улучшения обмена веществ при повышенных физических и умственных нагрузках 2-3 драже в сутки.Курс лечения 20-30 дней. Перерывы между курсами 1-3 месяца.Повторные курсы по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата детский возраст беременность I триместр.

Применение при беременности и кормлении грудью

Одно драже обеспечивает восполнение суточной потребности витаминов необходимых для нормального развития плода и поддержания здоровья беременной женщины.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы острой передозировки витамином А (развиваются через 6 ч после приема в дозе от 300 000 ЕД до 1 млн ЕД однократно): сонливость вялость диплопия головокружение сильная головная боль тошнота тяжелая рвота диарея раздражительность остеопороз кровотечение из десен сухость и изъязвление слизистой оболочки полости рта шелушение губ кожи (особенно ладоней) возбуждение спутанность сознания. Клиника обратима.Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременный прием других поливитаминных комплексов во избежание передозировки.

Особые указания

Возможно окрашивание мочи в желтый цвет что совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:На скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами не влияет.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше + 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.