Инструкция по применению
Унитиол Раствор для внутримышечного и подкожного введения ампулы 5 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Раствор для инъекций
Страна: Россия
Производитель: Мосхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Димеркаптопропансульфонат натрия
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг/мл

Действующее вещество

Димеркаптопропансульфонат натрия

Состав

1 мл 1 амп. димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат (унитиол) 50 мг 250 мг. Вспомогательные вещества: динатрия эдетат (трилон Б) 100 мкг, серная кислота 0.

Форма выпуска

Раствор для инъекций

Фармакокинетика

При парентеральном введении быстро всасывается в кровь. Cmax достигается через 15-30 мин после в/м инъекции. T1/2 - 1-2 ч. Экскретируется почками, главным образом, в виде продуктов неполного и полного окисления, частично в неизменном виде.

Показания

— интоксикация мышьяком, ртутью, висмутом, хромом, сердечными гликозидами — гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова) — диабетическая полиневропатия — хронический алкоголизм (в составе комплексной терапии) — делириозный психоз.

Способ применения и дозы

В/м, п/к. При интоксикации мышьяком - 5-10 мл препарата (из расчета 0.005 г/1 кг), в 1 сутки - 3-4 раза, во 2 сутки - 2-3 раза, в последующие - по 1-2 раза. При отравлениях соединениями ртути - по той же схеме в течение 6-7 сут. Лечение проводят до исчезновения признаков интоксикации. При дигиталисной интоксикации в первые 2 дня вводят 5-10 мл 5% водного раствора 3-4 раза/сут, затем 1-2 раза/сут до прекращения кардиотоксического действия. При гепатоцеребральной дистрофии – в/м 5-10 мл 5% раствора ежедневно или через день; курс лечения - 25-30 инъекций; при необходимости повторяют через 3-4 мес. При хроническом алкоголизме назначают 3-5 мл 2-3 раза в неделю. Для купирования делирия - однократно 4-5 мл.

Противопоказания

— печеночная недостаточность — артериальная гипертензия — повышенная чувствительность к препарату.

Побочные действия

Тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение унитиола с препаратами, в состав которых входят тяжелые металлы и щелочи, т.к. происходит быстрое разложение унитиола.