Инструкция по применению
Унитиол Раствор для внутримышечного и подкожного введения 5 % 5 мл 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: Брынцалов
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Димеркаптопропансульфонат натрия
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг/мл



Описание

Прозрачная бесцветная или розоватого цвета жидкость со слабым запахом сероводорода

Действующее вещество

Димеркаптопропансульфонат натрия

Состав

Активное вещество - унитиол 0,05 г в 1 мл раствора Вспомогательные вещества: вода для инъекций.

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

При парентеральном введении быстро всасывается в кровь. Максимальный уровень препарата в крови (Cmax) достигается через 15-30 мин после в/м инъекции. Период полувыведения (T1/2) -1-2 ч. Экскретируется почками, главным образом в виде продуктов неполного и полного окисления, частично - в неизменном виде.

Показания

Интоксикация мышьяком, ртутью, висмутом, хромом, сердечными гликозидами, гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова), диабетическая полинейропатия, хронический алкоголизм (в составе комплексной терапии), делирий.

Способ применения и дозы

Внутримышечно, подкожно. При интоксикации мышьяком - 5-10 мл препарата (из расчета 0,005 г/1 кг), в первые сутки - 3-4 раза, во вторые сутки - 2-3 раза, в последующие - по 1-2 раза. При отравлениях соединениями ртути - по той же схеме в течение 6-7 суг. Лечение проводят до исчезновения признаков интоксикации. При дигиталисной интоксикации в первые 2 дня вводят 5-10 мл 5 % водного раствора 3-4 раза в сутки, затем 1-2 раза в сутки до прекращения кардиотоксического действия. При гепатоцеребральной дистрофии - в/м 5-10 мл 5 % раствора ежедневно или через день курс лечения - 25-30 инъекций при необходимости повторяют через 3-4 мес. При хроническом алкоголизме назначают 3-5 мл 2-3 раза в неделю. Для купирования делирия-однократно 4-5 мл раствора.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, печеночная недостаточность артериальная гипертензия.

Побочные действия

Тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

В рекомендуемых дозах и по показаниям явлений передозировки не возникает.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение унитиола с препаратами, в состав которых входят тяжелые металлы и щелочи, т.к. происходит быстрое разложение унитиола.

Особые указания

При острых отравлениях наряду с введением препарата проводят промывание желудка, оксигенотерапию, введение глюкозы и др.

Условия хранения

Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С, в недоступном для детей месте.