Инструкция по применению
Унитиол Раствор для инъекций ампулы 5 % 5 мл 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Армения
Производитель: Ереванская ХФФ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Димеркаптопропансульфонат натрия
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг/мл

Описание

Прозрачная бесцветная или розоватого цвета жидкость со слабым запахом сероводорода

Действующее вещество

Димеркаптопропансульфонат натрия

Состав

1 мл содержит: Активное вещество: димеркаптопропансульфоната натрия моногидрат (унитиол) 50 мг. Вспомогательные вещества: серной кислоты раствор 0,1 М достаточное количество установления pH 3,1-4,5, вода для инъекций до 1 мл.

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

При парентеральном введении быстро всасывается в кровь. Максимальный уровень препарата в крови (Cmax) достигается через 15-30 мин после в/м инъекции. Период полувыведения (T1/2) -1-2 ч. Экскретируется почками, главным образом в виде продуктов неполного и полного окисления, частично - в неизменном виде.

Показания

Интоксикация мышьяком, ртутью, висмутом, хромом, сердечными гликозидами, гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова), диабетическая полинейропатия, хронический алкоголизм (в составе комплексной терапии), делирий.

Способ применения и дозы

Внутримышечно подкожно. При интоксикации мышьяком - 250-500 мг (5-10 мл препарата) из расчета 005 г/10 кг. в первые сутки - 3-4 раза во вторые сутки - 2-3 раза в последующие по 1-2 раза. При отравлениях соединениями ртути - по той же схеме в течение 6-7 сут. Лечение проводят до исчезновения признаков интоксикации. При дигиталисной интоксикации в первые 2 дня вводят 250-500 мг (5-10 мл препарата) 3-4 раза в сутки затем 1-2 раза в сутки до прекращения кардиотоксического действия. При гепатоцеребральной дистрофии - внутримышечно 250-500 мг (5-10 мл препарата) ежедневно или через день курс лечения - 25-30 инъекций при необходимости повторяют через 3-4 мес. При диабетической полинейропатии - внутримышечно 250 мг (5 мл препарата) курс лечения - 10 инъекций. При хроническом алкоголизме назначают 150-250 мг (3-5 мл препарата) 2-3 раза в неделю. Для купирования делирия - однократно 200-250 мг (4-5 мл препарата).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, печеночная недостаточность артериальная гипертензия.

Побочные действия

Тошнота, головокружение, тахикардия, бледность кожных покровов. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

В рекомендуемых дозах и по показаниям явлений передозировки не возникает.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение унитиола с препаратами, в состав которых входят тяжелые металлы и щелочи, т.к. происходит быстрое разложение унитиола.

Особые указания

При острых отравлениях наряду с введением препарата проводят промывание желудка, оксигенотерапию, введение глюкозы и др.

Условия хранения

Список Б. В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С, в недоступном для детей месте.