Инструкция по применению
Уралит-У Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 280 г

Характеристики



Форма выпуска: Гранулы
Страна: Германия
Производитель: Rottafarm
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Калия натрия гидроцитрат
Количество в упаковке: 1

Описание

Уралит-У - ощелачивающий препарат для лечения и профилактики мочекаменной болезни. Выпускается в виде гранул для приготовления раствора для приема внутрь. В комплект также входят: мерные ложки, зажимы, индикаторная бумага для изменения pH мочи и контрольные календари, где ведется учет показаний pH и принятых доз препарата.

Действующее вещество

Калия натрия гидроцитрат

Состав

Калия натрия гидроцитрат (гексакалий-гексанатрий-тригидро-пентацитрат), гидратная вода действующего вещества, краситель солнечный закат (Е 110), масло лимона.

Форма выпуска

Гранулы

Показания

Мочекислые камни (профилактика и лечение), нефроуролитиаз и цистинурия (вспомогательная терапия), подщелачивание мочи при порфирии кожи, урикозурии, лечении цитостатиками.

Способ применения и дозы

Гранулят растворяют в стакане воды и выпивают. Перед каждым приемом измеряют pH мочи, после чего определяют дозу. Средняя суточная доза — 10 г (4 мерные ложки), принимается утром и днем — по 1 мерной ложке, вечером — по 2 мерных ложки с учетом показателей pH свежей мочи: при мочекаменной болезни и урикозурии 6,2–6,8, при цистиновых камнях — 7,5–8,5, при лечении цитостатиками — минимум 7, при порфирии — 7,2–7,5. Правильно подобранная доза обеспечивает значения pH в пределах указанного диапазона, при более высоких значениях pH мочи, суточную дозу в вечерний прием следует уменьшить на 1/2 мерной ложки, если значения pH ниже — дозу увеличить на 1/2 мерной ложки.

Противопоказания

Острая и хроническая почечная недостаточность, абсолютный запрет на употребление поваренной соли, тяжелые нарушения КЩС (метаболический алкалоз), хронические инфекции мочевыводящих путей.

Применение при беременности и кормлении грудью

При необходимости применения во время беременности и кормления грудью следует соотносить ожидаемую пользу для матери и вероятный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Диспепсия, фосфатный нефроуролитиаз.

Взаимодействие с другими препаратами

Одновременное назначение препаратов дигиталиса или диеты, бедной натрием, требует учитывать, что средняя суточная доза содержит примерно 1,75г (44 ммоля) калия и 1г (44 ммоля) натрия.

Особые указания

В период применения препарата необходимо соблюдать диету, выпивать много жидкости.