Инструкция по применению
Уринал Нефро Капсулы 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Чехия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Биологически активная добавка к пище «Уринал Нефро» является преемником комплекса «НефраДоз (NefraDoz)».Мочекаменная болезнь (МКБ) является сегодня наиболее распространенным урологическим заболеванием: пациенты с МКБ составляют 30-40% в урологическом стационаре и, в основном, это пациенты трудоспособного возраста – 30-50 лет.По статистике, 12% мужчин и 5% женщин хотя бы раз в течение жизни переносят почечную колику, как правило, обусловленную МКБ. Более того, примерно 50% пациентов, у которых ранее была диагностирована МКБ, подвержены рецидиву заболевания в течение ближайших 10 лет.Натуральные растительные компоненты комплекса Уринал Нефро содержат биологически активные вещества (биоантрахиноны, ресвератрол, глицирризиновую кислоту, салидрозиды, икариин, и т.д.), которые улучшают функциональное состояние мочевыделительной системы и способствуют снижению камнеобразования.Компоненты Уринал Нефро способствуют облегчению выведения камней* и снижению риска повторного камнеобразования вне зависимости от их химического состава (в том числе при фосфатном, карбонатном, оксалатном и уратном камнеобразовании).

Состав

Экстракт корней марены красильной, оболочка капсулы (желатин, вода, краситель оксид железа желтый), экстракт листьев ортосифона тычиночного, экстракт листьев эпимедиума, экстракт корня родиолы розовой, экстракт корня солодки голой, наполнитель лактоза, ресвератрол, экстракт листьев гинкго билоба.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Возможны повторные курсы приема в течение года. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, энурез, прием в вечернее время, бессонница, повышенное артериальное давление, повышенная нервная возбудимость, нарушения ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.