Инструкция по применению
Уро-гиал раствор для инъекций 50мл N1

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: СЛС
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гиалуронат натрия
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Гиалуронат натрия

Состав

1 мл раствора содержит: гиалуронат натрия 0,8 мг, натрия дигидрофосфат моногидрат 0,45 мг, динатрия фосфат безводный 2 мг, натрия хлорид 8,5 мг±0,05, вода деионизированная q.s.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Временная защита слизистой оболочки мочевого пузыря при различного рода манипуляциях (уретро-цистоскопия, лучевая терапия и т.д.). Кроме того, многочисленными научными исследованиями доказана эффективность применения гиалуроната натрия при следующих заболеваниях:Хронический/ рецидивирующий цистит;Лучевой цистит;Интерстициальный цистит;Гиперактивный мочевой пузырь (в составе комплексной терапии с М-холинолитиками или агонистами ванилоидных рецепторов (RTX))

Способ применения и дозы

1.Получите письменное информированное согласие пациента на манипуляцию.2. Объясните пациенту особенности проведения процедуры и внутрипузырной инстилляционной терапии (приблизительно так, как указано ниже):а) если источник болевого синдрома мочевой пузырь, то Вы можете почувствовать облегчение через 5 – 15 минут после введения смеси;б) в начальной фазе лечения, Вам могут потребоваться внутрипузырные инстилляции чаще, чем 1 раз в неделю.в) постарайтесь удерживать введенную смесь в Вашем мочевом пузыре не менее 30 минут, но не более 2-х часов.г) иногда (редко) возникают побочные эффекты, о которых Вам следует незамедлительно уведомить врача.д) крайне редко, возникает эффект отдачи, когда через 5 – 6 часов после введения препарата, боль возвращается с большей интенсивностью.е) инстилляционная терапия может потребовать проведения большего количества процедур, чем было запланировано.3.Приготовьте пациентку для катетеризации на урогинекологическом кресле.4. Вымойте руки. Наденьте нестерильные перчатки.5.Обработайте наружное отверстие уретры антисептиком.6. Введите анестетик-любрикант в уретру, оставив небольшое количество геля, для любрикации катетера.7. Снимите перчатки.8.Вымойте руки.9. Наберите препарат(ы) в шприц объемом 60 мл. (Если используется комбинация препаратов, то предварительно смешайте их в флаконе с «УРО-ГИАЛом», используя шприц 10 мл).10.Откройте упаковку катетера.11.Наденьте стерильные перчатки.12. Сохраняя стерильность, нанесите небольшое количество анестетика-любриканта на наконечник катетера и аккуратно введите катетер в уретру и далее, в мочевой пузырь. 13. Опорожните мочевой пузырь, затем присоедините шприц к катетеру и медленно введите раствор в мочевой пузырь.14. Извлеките катетер из уретры.15.Выбросьте в специальные контейнеры использованные принадлежности.16. Снимите перчатки.17. Вымойте руки.18. Сделайте запись в амбулаторной карте и назначения пациенту.«УРО-ГИАЛ» вводится внутрипузырно, 1 раз в неделю. Курс составляет от 4-х до 12 инстилляций.Флакон следует достать из холодильника не менее чем за 20 минут до применения. Перед применением температура флакона должна быть не менее 20С. Перед введением препарата «УРО-ГИАЛ», следует опорожнить мочевой пузырь. Препарат «УРО-ГИАЛ» вводиться в полость мочевого пузыря с помощью урологического катетера на срок не менее 30 минут.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов состава Уро-Гиал, Беременность, кормление грудью, дети.

Побочные действия

Побочные явления не выявлены. Может наблюдаться индивидуальная непереносимость.

Взаимодействие с другими препаратами

Отмечена несовместимость между гиалуронатом натрия и четвертичными солями аммония, такими как бензалкония хлорид. Не следует допускать контакт Уро-Гиал с такими препаратами или с медицинскими и хирургическими инструментами, обработанными такими препаратами.

Особые указания

Препарат Уро-Гиал предназначен только для введения в полость мочевого пузыря с помощью урологического катетера.Выпоте введение, строго соблюдая правила асептики.Перед использованием проверяйте целостность и герметичность флакона: не используйте препарат, если флакон или его крышка повреждены, а также проверяйте целостность упаковки шприца, иглы и урологического катетера. При их повреждении применение препарата не допустимо.Не используйте после истечения срока годности.Уро-Гиал предназначен для инстилляции в мочевой пузырь, которые должен выполнять врач, имеющий специальную подготовку, в специально оборудованном помещении, с соблюдением всех правил асептики.