Инструкция по применению
Урокард таблетки 2 мг 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Доксазозин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 2 мг



Описание

Таблетки от белого до белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской и риской.

Действующее вещество

Доксазозин

Состав

Состав для дозировки 2 мг: Активное вещество: доксазозина мезилата в пересчете на доксазозин - 2 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 27,5 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 85,2743 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (примогель) - 2,4 мг, магния стеарат - 1,2 мг, натрия лаурилсульфат - 1,2 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь в терапевтических дозах доксазозин хорошо всасывается абсорбция - 80-90% (одновременный прием пищи замедляет всасывание на 1 ч.). Максимальная концентрация в плазме крови создается через 3 ч. При вечернем приеме время достижения максимальной концентрации удлиняется до 5 ч. Биодоступность - 60-70% (пресистемный. метаболизм). Связь с белками плазмы крови - около 98%. Выведение из плазмы крови происходит в 2 фазы с конечным периодом полувыведения 19-22 часа что позволяет принимать препарат один раз в сутки. Доксазозин интенсивно метаболизируется в печени путем о-диметилирования и гидроксиллирования. У пациентов с нарушенной функцией печени а также при приеме препаратов способных изменять "печеночный" метаболизм может нарушаться процесс биотрансформации препарата. Основное выведение через кишечник (63-65 % в виде метаболитов и около 5% - в неизменном виде). Почками выводится 10%. Исследования фармакокинетики доксазозина у пожилых больных и у больных с заболеваниями почек не выявили существенных фармакокинетических различий.

Показания

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы: как при наличии артериальной гипертензии так и при нормальном уровне АД. Артериальная гипертензия: в комбинации с другими гипотензивными средствами такими как тиазидные диуретики бета-адреноблокаторы блокаторы "медленных" кальциевых каналов (БМКК) или ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

Способ применения и дозы

Таблетки следует принимать один раз в день (утром или вечером) независимо от приема пищи не разжевывая и запивая достаточным количеством воды. При лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы начальная доза - 1 мг/сутки (1/2 таблетки по 2 мг) для того чтобы свести к минимуму возможность развития ортостатической гипотензии и/или обморока. При необходимости в зависимости от показателей уродинамики и наличия симптомов ДГПЖ увеличивают дозу (с интервалом 1-2 недели) до 2-4 мг/сутки. Максимально допустимой дозой является доза 8 мг в сутки. Рекомендуемая поддерживающая доза-2-4 мг/сутки. При лечении больных артериальной гипертензией начальная доза препарата составляет 1 мг (1/2 таблетки по 2 мг) в сутки перед сном. После приема первой дозы больной должен находиться в постели в течение 6-8 часов. Это требуется в связи с возможностью развития феномена "первой дозы" особенно выраженной на фоне предшествующего приема диуретиков. При недостаточности терапевтического эффекта суточную дозу можно увеличить до 2 мг через 1-2 недели. В последующем через каждые 1-2 недели дозу можно увеличить на 2 мг. У подавляющего большинства больных оптимальный терапевтический эффект достигается при дозе 8 мг в сутки. Максимальную суточную дозу препарата 16 мг в сутки' превышать нельзя. После достижения стойкого терапевтического эффекта дозу обычно снижают (средняя терапевтическая доза при поддерживающей терапии обычно равна 2- 4 мг в сутки). Урокард принимают длительно. Продолжительность лечения определяет врач.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к доксазозину другим производным хиназолина или к любому из вспомогательных компонентов препарата. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). Непереносимость лактозы дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

До настоящего времени опыт применения доксазозина у больных артериальной гипертензией во время беременности и в период кормления грудью недостаточен. Поэтому несмотря на отсутствие тератогенного и эмбриотоксического эффектов по данным экспериментальных исследований Урокард может применяться во время беременности и в период кормления грудью только после тщательного взвешивания врачом соотношения польза/риск для матери и риска для плода/ребенка.

Побочные действия

Частота возникновения побочных эффектов характеризуется как часто (>1%) нечасто (>01% 001% < 01%) и очень редко включая отдельные сообщения Сердечно-сосудистая система: часто - учащенное сердцебиение периферические отеки, нечасто - ортостатическая гипотензия обморочные состояния - феномен "первой дозы" аритмия стенокардия инфаркт миокарда. Центральная и периферическая нервная система: часто - головная боль головокружение повышенная утомляемость нарушение сна, нечасто - "кошмарные" сновидения дисфория ухудшение памяти, редко - депрессия парастезии. Органы чувств: часто - нарушение аккомодации фотофобия нарушение слезоотделения шум в ушах нарушение вкусовых ощущений редко - нечеткость зрительного восприятия конъюнктивит. Мочеполовая система: часто - частое мочеиспускание задержка эякуляции, нечасто - дизурия, редко - импотенция приапизм. Прочие: часто - астения боли в грудной клетке, нечасто - кашель носовые кровотечения алопеция мышечные боли мышечная слабость суставные боли подагра покраснение кожи лица, редко - повышенное потоотделение снижение температуры тела у пациентов пожилого возраста. При хирургическом лечении катаракты или на фоне предварительного лечения тамсулозином у некоторых пациентов может развиться синдром атоничной радужки Лабораторные показатели: нечасто - гипокалиемия, редко - транзиторное повышение активности ферментов печени гипогликемия лейкопения тромбоцитопения, очень редко - эритроцитопения уремия креатининемия.

Передозировка

Симптомы: выраженное снижение АД иногда сопровождается обмороком. Лечение: больного необходимо поместить в горизонтальное положение приподнять ноги и провести мероприятия по восполнению объема циркулирующей крови. Симптоматическая терапия. Гемодиализ неэффективен.

Взаимодействие с другими препаратами

Доксазозин усиливает гипотензивный эффект антигипертензивных средств (при - 1 использовании комбинации с ними требуется коррекция дозы). Не отмечено неблагоприятного взаимодействия при одновременном применении доксазозина и тиазидных диуретиков фуросемида бета-адреноблокаторов БМКК ингибиторов АПФ антибактериальных средств гипогликемических средств для приема внутрь непрямых антикоагулянтов и урикозурических средств. Препарат не оказывает влияния на степень связывания с белками плазмы крови ди- токсинафенитоина. При одновременном применении с индукторами микросомального окисления в печени (этанол барбитураты фенилбутазон трициклические антидепрессанты) возможно - повышение эффективности доксазозина а с ингибиторами (циметидин) - снижение. Нестероидные противовоспалительные препараты (особенно индометацин) эстрогены и симпатомиметические средства могут снижать гипотензивный эффект доксазозина. Устраняя альфа-адреностимулирующие эффекты эпинефрина доксазозин может приводить к развитию тахикардии и артериальной гипотензии. Сопутствующее применение с производными сульфонилпиперазина (селективными ингибиторами ФДЭ 5) такими как силденафил тадалафил варденафил может привести . к развитию артериальной гипотензии.

Особые указания

Особую осторожность необходимо проявлять при применении препарата Урокард у больных с нарушениями функции печени особенно в тех случаях когда применяют одновременно препараты способные изменять "печеночный" метаболизм (например этанол барбитураты фенилбутазон трициклические антидепрессанты циметидин). В случаях ухудшения показателей функционального состояния печени препарат немедленно отменяют. С целью предотвращения ортостатических реакций больные должны избегать неожиданных и резких смен положения тела (переход из положения "лежа" в положение "СТОЯ"). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В связи с тем что препарат Урокард способен вызывать ортостатические реакции в начале лечения или в период повышения дозировок больным целесообразно воздерживаться от всех потенциально опасных видов деятельности в частности от управления автотранспортом другими транспортными средствами и механизмами. Прием алкоголя способен усиливать нежелательные реакции.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.