Инструкция по применению
Уролесан Капли для приема внутрь 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Россия
Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Душицы обыкновенной травы экстракт+Клещевины обыкновенной семян масло+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Хмеля сопло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Душицы обыкновенной травы экстракт+Клещевины обыкновенной семян масло+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Хмеля сопло

Состав

Действующее вещество: Пихты масло, Мяты перечной листьев масло, Клещевины обыкновенной семян масло, Моркови дикой семян экстракт жидкий, Хмеля соплодий экстракт жидкий, Душицы обыкновенной травы экстракт жидкийКонцентрация действующего вещества: 843,55

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Уролесан не предоставлены.

Показания

В комплексной терапии острого цистита, пиелонефрита, мочекаменной болезни, холецистита, дискинезии желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу, желчнокаменной болезни.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь по 8-10 капель на кусочке сахара 3 раза в день до еды. Длительность курса лечения зависит от тяжести заболевания и составляет от 5 до 30 дней. При почечных и печеночных коликах разовая доза может быть повышена до 15-20 капель. Увеличение разовой дозы, длительности и проведение повторного курса лечения возможно только по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, изжога, тошнота, диарея, возраст до 18 лет.С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея, абдоминальные боли);Аллергические реакции (покраснение лица, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек).Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость.Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, гипотензия.

Передозировка

Симптомы: возможно усиления побочных эффектов (головокружение, тошнота). Лечение: проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не известно.

Особые указания

Не следует применять препарат Уролесан, если диаметр камней в почках превышает 3 мм.Препарат содержит 60% этилового спирта. В максимальной разовой дозе препарата содержание этилового спирта составляет 0.6 мл. В максимальной суточной дозе препарата содержание этилового спирта составляет 1.8 мл.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиПри приеме в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

Условия хранения

Беречь от детей