Инструкция по применению
Уролесан Капсулы 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Душицы обыкновенной травы экстракт+Клещевины обыкновенной семян масло+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Хмеля сопло
Количество в упаковке: 40

Действующее вещество

Душицы обыкновенной травы экстракт+Клещевины обыкновенной семян масло+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Хмеля сопло

Состав

1 капсула содержит: уролесан; экстракт густой, в перерасчете на содержание влаги 10% 10.7 мг, в т. ч: экстракт семян моркови дикой 1.84 мг; экстракт шишек хмеля 6.33 мг; экстракт травы душицы обыкновенной 1.46 мг; масло мяты перечной листьев 7.46 мг; масло пихты 25.5 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Уролесан; является комплексом биологически активных компонентов, в связи с этим проведение его фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

В комплексной терапии острых и хронических инфекций мочевыводящих путей и почек (цистит, пиелонефрит); мочекаменная болезнь; желчнокаменная болезнь; хронический холецистит; дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу.

Способ применения и дозы

Препарат применяют внутрь, до еды, по 1 капсуле 3 раза в день. При возникновении почечных и печеночных колик разовую дозу можно однократно повысить до 2-х капсул, затем на последующих приемах вернуться к обычной разовой дозе (1 капсула). Капсулы следует принимать, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.При острых состояниях (в том числе при почечной и печеночных коликах) продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях - до 1 месяца.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактазная мальабсорбция; гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; диаметр камней в почках превышает 3 мм; возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (эффективность и безопасность не изучались).

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: диспепсические явления (изжога, тошнота, рвота, диарея);Аллергические реакции: зуд, покраснение лица, кожная сыпь, ангионевротический отек (чувство першения в горле, затруднение дыхания, отек лица, языка);Со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость;Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение/понижение АД.

Передозировка

Возможно усиление дозозависимых побочных эффектов (в том числе тошнота, рвота, головокружение).Лечение симптоматическое: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом! При возникновении острых состояний следует немедленно обратиться к врачу!При хронических состояниях в случае отсутствия эффекта на фоне приема препарата в течение 5-7 дней следует обратиться к врачу.В случае появления побочных эффектов или нежелательных реакций, не указанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмамиВ случае возникновения побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение) пациентам следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).