Инструкция по применению
Уролесан сироп 180мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Кировская фармацевтическая фабрика
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Душицы обыкновенной травы экстракт+Клещевины обыкновенной семян масло+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Хмеля сопло
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0

Действующее вещество

Душицы обыкновенной травы экстракт+Клещевины обыкновенной семян масло+Моркови дикой семян экстракт+Мяты перечной листьев масло+Пихты масло+Хмеля сопло

Состав

100 мл масло пихты 6.76 г масло мяты перечной 1.69 г масло касторовое 9.295 г жидкий экстракт семян моркови дикой 19.435 г жидкий экстракт шишек хмеля 27.88 г жидкий экстракт травы душицы обыкновенной 19.295 г. Вспомогательные вещества: натрия эдетат (трилон Б) 4 мг.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 мин и продолжается 4-5 ч. Максимальный эффект наступает через 1-2 ч. Выводится через ЖКТ и почками.

Показания

— мочекаменная и желчнокаменная болезнь — пиелонефрит — холецистит — дискинезия желчевыводящих путей.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь до еды. Рекомендуемые дозы для взрослых: по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки до еды. При острых состояниях (в т.ч. при почечной и печеночной коликах) продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях - от 7 дней до 1 месяца. При возникновении почечной и печеночной колик разовую дозу можно повысить до 2-х чайных ложек (10 мл), затем на последующий прием вернуться к обычной разовой дозе (5 мл). Рекомендуемые дозы для детей: 6-7 лет - по 2-4 мл 3 раза в сутки; 7-14 лет - по 4-5 мл 3 раза в сутки. Дозировка проводится с помощью шприца-дозатора.

Противопоказания

— повышенная чувствительность к компонентам препарата — гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием данных о безопасности применения препарата у данной категории пациентов.

Побочные действия

Аллергические реакции, тошнота, головокружение, диарея, изжога.

Передозировка

Симптомы: тошнота, головокружение. Лечение: обильное теплое питье, покой, активированный уголь, атропина сульфат (0,0005-0,001 г).

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучено.

Особые указания

Не применять препарат в случае, если диаметр камней превышает 3 мм. Пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с повышенным содержанием глюкозы в плазме крови необходимо быть острожными, применяя Уролесан-М (в состав препарата входит сахарный сироп). Разовая доза препарата (5 мл) содержит 0,38 углеводных единиц (4,5865 г сахарозы). Влияние на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В сухом месте