# Инструкция по применению
# Уропрост суппозитории ректальные 50 мг 10 шт




## Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Альтфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг

## Описание

Суппозитории от белого до желтовато-серого или серого цвета, торпедообразной формы.

## Действующее вещество

Простаты экстракт

## Состав

На один суппозиторий:Действующее вещество: простаты экстракт, в пересчете на водорастворимые пептиды (субстанция "Сампрост", Простаты экстракт) - 10 мг, Вспомогательное вещество: жирных кислот глицериды (Витепсол W35) - до получения суппозитория массой 1,0 г.

## Форма выпуска

Суппозитории

## Фармакокинетика

Как пептидный препарат, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Кумулятивного действия не имеет.

**Показания**

Хронический простатит, состояние до и после операций на предстательной железе, доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

**Способ применения и дозы**

Препарат применяют ректально. Освободив суппозиторий от контурной упаковки, вводят его в задний проход после дефекации или очистительной клизмы.Применяют по 1 суппозиторию 1 раз в день. После введения препарата желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 мин.Длительность лечения - 20 дней.По показаниям возможны повторные курсы, рекомендуется проводить не ранее, чем через 2-4 недели.

**Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость (в т.ч. гиперчувствительность в анамнезе).

**Побочные действия**

Особенности технологии выделения этих пептидов нивелируют их молекулярную видоспецифичность, в результате чего полученные препараты лишаются антигенных свойств и ассоциированных с ними побочных эффектов.Часто - 1-10%, иногда - 0,1 - 1%, редко - 0,01-0,1%, очень редко - менее 0,01%, включая отдельные случаи.Очень редко - аллергические реакции, часто - зуд в заднем проходе, иногда - диарея, метеоризм.

**Передозировка**

В настоящее время случаи передозировки не отмечались.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Отрицательного взаимодействия не отмечалось.Препарат может использоваться при комплексной терапии.

**Особые указания**

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим применение различных групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.При лечении рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.