Инструкция по применению
Уропрост-Д Суппозитории ректальные 6 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Альтфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 6 мг
Срок годности: 3.0



Описание

Средство лечения хронического простатита

Действующее вещество

Простаты экстракт

Состав

Экстракт простаты 30 мг, что соответствует содержанию водорастворимых пептидов 6 мг. Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 (полиэтиленоксид 1500) - 2180 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Как пептидное вещество, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот. Не обладает кумулятивным действием.

Показания

Хронический простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе. Лечение ургентного недержания мочи, ургентных позывов к мочеиспусканию и учащенного мочеиспускания при неосложненных формах гиперактивности мочевого пузыря у женщин в климактерическом и постклимактерическом периодах.

Способ применения и дозы

Внутрь, ректально, в/м. Доза и частота применения зависит от показаний и применяемой лекарственной формы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не применяется у женщин

Побочные действия

При ректальном применении: часто - зуд заднего прохода, нечасто - диарея, метеоризм.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместим с антибактериальными препаратами, применяемыми для лечения простатита.

Особые указания

Препараты, содержащие экстракт предстательной железы, не являются взаимозаменяемыми, поэтому следует строго соблюдать показания к применению для каждого из них. До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы. В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно проводить стандартный контроль данного заболевания. Перед началом лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

Условия хранения

Хранить в прохладном, недоступном для детей месте.