Инструкция по применению
Уро-ваксом Капсулы 6 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Швейцария
Производитель: Астеллас
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Лиофилизированный лизат бактерий Escherichia coli
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 6 мг
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Лиофилизированный лизат бактерий Escherichia coli

Состав

В 1 капсуле содержится: лиофилизированный лизат бактерий Escherichia coli 6 мг. Вспомогательные вещества: пропилгаллат (безводный) - 0.084 мг, натрия глутамат (безводный) - 3.03 мг, полоксамер 188 - 2.51 мг, симетикон, эмульсия 30% - 0.396 мг, натрия хлорид - 4.94 мг, маннитол - до 60 мг, крахмал прежелатинизированный - 77 мг, магния стеарат - 3 мг, маннитол - необходимое количество до 200 мг. Состав оболочки капсулы: железа оксид красный (Е172) - 0.01 мг, железа оксид желтый (Е172) - 0.21 мг, титана диоксид (Е171) - 0.87 мг (красители), желатин - до 50 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Уро-Ваксом; не предоставлены.

Показания

Комбинированное лечение и профилактика рецидивов хронической инфекции мочевых путей, особенно циститов, независимо от природы микроорганизма, в сочетании с антибиотиками или другими противомикробными средствами у взрослых и детей старше 4 лет.

Способ применения и дозы

В лечебных целях назначают по 1 капс. ежедневно утром натощак в качестве дополнительного лекарственного средства при проведении обычной противомикробной терапии до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. Максимальный срок лечения 3 месяца.Для профилактики рецидивов хронической инфекции мочевого тракта назначают по 1 капс. ежедневно утром натощак в течение 3 месяцев.В случае если ребенку трудно проглотить капсулу, ее следует открыть и смешать содержимое с питьем (фруктовый сок, молоко и т.д.).Длительность лечения или назначение повторного курса терапии определяется индивидуально, исходя из общего состояния пациента.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Клинические исследования применения Уро-Ваксома при беременности не проводились.Исследования на животных не выявили отрицательного воздействия на течение беременности, развитие эмбриона, плода и/или постнатальное развитие.В отношении возможности применения препарата в период грудного вскармливания специальные исследования не проводились и сведений по данному вопросу до настоящего времени не имеется.

Передозировка

Сведения о случаях передозировки отсутствуют.Природа Уро-Ваксома и результаты изучения его токсичности на животных указывают на то, что передозировка маловероятна.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не установлено.В качестве меры предосторожности не следует применять препарат за 2 недели до и в течение 2-х недель после приема внутрь живых вакцин. Иммунодепрессивные препараты могут оказывать влияние на действие препарата.

Особые указания

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиУро-Ваксом; не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

Беречь от детей