Инструкция по применению
Ваготил раствор 36% 50г

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Польша
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Поликрезулен
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 360 мг/1 г

Описание

Раствор для местного применения Ваготил - противобактериальный препарат, который оказывает прижигающее и вяжущее действие. Обладает местным сосудосуживающим и гемостатическим свойством. Ускоряет регенерацию клеток эпителия. Применение Ваготила не приводит к возникновению рубцов.

Действующее вещество

Поликрезулен

Состав

Поликрезулен, деминерализованная вода.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Эрозия влагалища и шейки матки (в том числе вызванные давлением пессариев). Вагиниты, вызванные Trichomonas vaginalis и Candida albicans. Кровотечение после проведения диагностической биопсии и удаления полипов, электрокоагуляции эрозии шейки матки. Местное лечение труднозаживающих ран, в том числе трофических язв голени. С гемостатической целью при небольших хирургических и стоматологических вмешательствах.

Способ применения и дозы

Препарат используют только для местного применения. При эрозии влагалища и шейки матки на 1-3 минуты приложить тампон, пропитанный препаратом, избыток препарата удалить сухим тампоном. Процедуру следует повторять 2-3 раза в неделю, но не более 10 дней. При язвах, трещинах слизистой оболочки, ожогах, а также для спринцевания влагалища применяют раствор, получаемый при разведении 5-15 мл препарата в 1 л теплой воды. С целью остановки кровотечения (гемостаза) на кровоточащее место накладывают тампон, смоченный препаратом, на 1-3 минуты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременности и лактация. Применение препарата во время менструации при лечении гинекологических заболеваний. При применении препарата для лечения гинекологических заболеваний следует отказаться от половой жизни и не использовать мыльные растворы при гигиенических процедурах.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

Аллергические реакции (местное раздражение, зуд жжение, сыпь, анафилаксия), при проведении гинекологических процедур - покраснение, отек влагалища и вульвы, чувство инородного тела во влагалище, при использовании препарата в стоматологии - повреждение зубной эмали.

Передозировка

Случаи передозировки препарата Ваготил не известны.

Взаимодействие с другими препаратами

С препаратами, имеющими щелочную реакцию, происходит экзотермическая реакция, усиливающая химический ожог слизистых оболочек.

Особые указания

Препарат применяется строго по назначению врача. Препарат используется только для местного применения. При применении препарата другие лекарственные средства для местного действия не используются. При применении в стоматологии избегать попадания препарата на зубную эмаль, в случае контакта с зубами тщательно прополоскать рот теплой водой. Во влагалищных мазках ВИЧ-инфицированных женщин, применяющих поликрезулен, обнаружено повышенное количество копий рибонуклеиновой кислоты (РНК) вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1), что может облегчать инфицирование партнера. Специальные меры предосторожности при уничтожении неиспользованного лекарственного препарата. Лекарственные препараты нельзя выбрасывать в канализацию или в домашние контейнеры для отходов. Следует поинтересоваться у фармацевта, что делать с ненужными уже лекарственными препаратами. Это будет способствовать защите окружающей среды.