Инструкция по применению
Валерианы МФФ Настойка 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с красноватым оттенком и характерным запахом.

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт

Состав

Для приготовления настойки используется: Активный компонент: Валерианы лекарственной корневища с корнями - 200,0 г Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл настойки

Форма выпуска

Настойка

Показания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, в составе комбинированной терапии - функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20 - 30 капель на прием 3 - 4 раза в день, детям - по капле на каждый год жизни - 3 раза в день. Курс лечения до 4 недель. Повторные курсы лечения возможны после согласования с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст (до 1 года).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны вялость, слабость, сонливость, подавленность, снижение работоспособности (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении - запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных, седативных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,32 г, в максимальной суточной дозе препарата для взрослых - 1,3 г. В одной капле препарата содержится 0,01 г абсолютного этилового спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 ос. Хранить в недоступном для детей месте.