Инструкция по применению
Валерианы Настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Тверская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость красно-коричневого цвета и характерного ароматного запаха. В процссе хранеия допускается образование налета на стенках первичой упаковки.

Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт

Состав

Для приготовления настойки используют: Валерианы лекаарствеой корневища с корнями - 200 г Вспомогтельное вещство: Этанол (этиловый спирт) 70 % - до получения 1000 мл настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, в составе комбинированной терапии - функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы желудочно-кишечного тракта.

Способ применения и дозы

Применяют внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день, детям - по 1 капле на каждый год жизни 1-3 раза в день. Курс лечения - до 4 недель. Повторные курсы лечения возможны после согласования с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны вялость, слабость, сонливость, подавленность, снижение работоспособности (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении - запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,32 г, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата составляет 1,3 г. В одной капле препарата содержится 0,01 г абсолютного этилового спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.