**Инструкция по применению**
**Валерианы Гиппократ Настойка 25 мл**

### Характеристики




Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Гиппократ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт
Количество в упаковке: 1

### Описание

Прозрачная жидкость от коричневого до красно-коричневого цвета, с характерным запахом.

### Действующее вещество

Валерианы лекарственной корневищ с корнями экстракт

### Состав

Для приготовления препарата необходимо: Активный компонент: Валерианы лекарственной корневища с корнями - 200 г, Вспомогательное вещество: Этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

### Форма выпуска

Настойка

### Показания

Повышенная нервная возбудимость, бессонница, в составе комплексной терапии функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы органов желудочнокишечного тракта.

**Способ применения и дозы**

Принимают внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день, детям - по 1 капле на каждый год жизни 1-3 раза в день. Курс лечения - до 4 недель. Повторные курсы лечения возможны после согласования с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Возможны слабость, сонливость, снижение работоспособности, при длительном применении - запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

При применении препарата в соответствии с инструкцией передозировка маловероятна. При применении препарата в дозах, превышающих рекомендованные, возможно усиление дозозависимњх побочных эффектов. Лечение: симптоматическое. При применении препарата в соответствии с инструкцией передозировка маловероятна. При применении препарата в дозах, превышающих рекомендованные, возможно усиление дозозависимњх побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат усиливает действие снотворных средств, седативных и спазмолитических лекарственных препаратов.

**Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых составляет 0,32 г, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата составляет 1,3 г. В одной капле препарата содержится 0,01 г абсолютного этилового спирта.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.