Инструкция по применению
Валидол с изомальтом Авексима Таблетки подъязычные 60 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 60 мг
Срок годности: 24.0

Описание

Валидол Авексима таблетки сублингвальные с изомальтом оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Активное вещество: левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) 60 мг.
Вспомогательные вещества: изомальт, кремния диоксид коллоидный, кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При сублингвальном применении левоментола раствор в ментил изовалерате всасывается со слизистой оболочки полости рта. Метаболизируется в печени и выводится почками в виде глюкуронидов. При применении лекарственных форм содержащих декстрозу (глюкозу), последняя полностью усваивается организмом, почками не выводится (появление в моче является патологическим признаком).

Показания

Функциональная кардиалгия, неврозы, как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Способ применения и дозы

Сублингвально, 2-3 раза/сут. Кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 мин после приема необходимо назначение другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) возможно в случае, если ожидаемая польза терапии для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Побочные действия

Возможно: тошнота, слезотечение, головокружение, аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы:тошнота, головная боль, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы, нарушение сердечной деятельности, состояние возбуждения. Лечение: отмена препарата,симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с препаратами, оказывающими угнетающее влияние на ЦНС, наблюдается усиление их действия.

Особые указания

При необходимости применения лекарственных форм содержащих декстрозу (глюкозу) требуется осторожность. Не рекомендуется одновременный прием алкоголя. Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами При применении пациенты должны соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и других потенциально опасных видах деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При комнатной температуре