Инструкция по применению
Валидол Авексима Таблетки подъязычные с глюкозой 60 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Ирбитский ХФЗ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 60 мг



Описание

Препарат с рефлекторным сосудорасширяющим действием

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Активные вещества: левоментола раствор в метилизовалерате 60 мг, декстроза (глюкоза)188 мг.Вспомогательные вещества: кальция стеарат, сахароза (сахар) — до получения таблетки массой 800 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

кардиалгия,стенокардия,синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни),истерия,невроз,головная боль на фоне приема нитратов.

Способ применения и дозы

Сублингвально (взрослым).Таблетку следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 табл. 2–3 раза в день.Суточная кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или если у отдельных больных в ближайшие 5 мин после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.С осторожностью: больные сахарным диабетом (препарат содержит сахар).

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

При длительном приеме могут наблюдаться легкая тошнота, слезотечение, головокружение. Эти явления обычно проходят самостоятельно.

Особые указания

В 1 таблетке содержится 188 мг декстрозы моногидрата (глюкозы моногидрата), 450 мг сахара (сахарозы), что соответствует 0,054 ХЕ, что следует учитывать больным сахарным диабетом.