Инструкция по применению
Валидол Фармстандарт таблетки сублингвальные 60 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 60 мг
Срок годности: 24.0



Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, с сероватыми вкраплениями, с фаской и риской и, с характерным запахом ментола.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Действующее вещество: левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) – 60, 0мг Вспомогательные вещества: сахароза (сахар белый) – 1140,7 мг, декстрозы моногидрат (глюкоза моногидрат) – 17,3 мг, кальция стеарат – 5,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При сублингвальном (подъязычном) применении левоментол абсорбируется со слизистой оболочки полости рта, метаболизируется в печени и выводится почкам в виде глюкуронидов.

Показания

Функциональные кардиалгии, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Способ применения и дозы

Препарат назначают взрослым по 1 таблетке под язык до ее полного рассасывания. Принимают по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Кратность и продолжительность приема определяются в зависимости от эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 минут после приема препарата, необходимо обратиться к врачу для назначения другой терапии

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит сахаразы /изомальтазы, неперенносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет (отсутствуют данные по эффективности и безопасности применении препарата у детей).

Побочные действия

Могут наблюдаться тошнота, слезотечение, головокружение. При отмене препарата эти побочные эффекты обычно проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Передозировка Симптомы: головная боль, тошнота, состояние возбуждения, нарушение сердечной деятельности, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременный прием с нитратами способствует уменьшению головной боли, возникающей при их применении.

Особые указания

Не рекомендуется одновременны прием алкоголя. С осторожностью применять пациентам с сахарным диабетом (препарат содержит сахар). Количество сахарозы в 1 таблетке соответствует 0,09 ХЕ (хлебных единиц).

Условия хранения

В сухом месте