Инструкция по применению
Валидол Капсулы подъязычные 50 мг 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: МЕЛИГЕН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Левоментола раствор в ментил изовалерате
Количество в упаковке: 20



Описание

Мягкие желатиновые капсулы шарообразной формы, от бесцветного до светло-желтого цвета, заполнены прозрачной, бесцветной или слегка окрашенной маслянистой жидкостью с запахом ментола.

Действующее вещество

Левоментола раствор в ментил изовалерате

Состав

Состав на одну капсулу: Действующее вещество: Левоментола раствор в ментилизовалерате (валидол) 50 мг Состав оболочки капсулы: Желатин 17 мг Глицерол 5 мг Метилпарагидроксибензоат 0, 14 мг

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

При сублингвальном применении абсорбируется со слизистой оболочки полости рта. После всасывания биотрансформируется в печени и выводится почками в виде глюкуронидов.

Показания

Функциональная кардиалгия, неврозы, а также как противорвотное средство при морской и воздушной болезни.

Способ применения и дозы

Валидол назначают взрослым под язык. Капсулу следует держать во рту под языком до полного рассасывания. Принимают по 1 капсуле 2-3 раза в день. Суточная кратность и продолжительность приема определяется в зависимости от эффективности лечения. При недостаточно выраженном эффекте или, когда у отдельных больных в ближайшие 5 мин после приема препарата эффект не наблюдается, необходимо обратиться к лечащему врачу для назначения другой терапии.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Назначение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны тошнота, слезотечение, головокружение. При отмене препарата эти побочные явления обычно проходят самостоятельно. Возможно развитие аллергических реакций (кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек).

Передозировка

Симптомы: головная боль, тошнота, состояние возбуждения, нарушение сердечной деятельности, резкое снижение артериального давления, угнетение центральной нервной системы.Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении с лекарственными средствами, угнетающими центральную нервную систему, усиливает действие последних. Одновременное применение препарата с нитратами уменьшает головную боль, которая возникает при их применении.

Особые указания

Не рекомендуется одновременный прием алкоголя.В период приема препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.